

Pakkausselostetiedot

Depo-Medrol cum Lidocain 40 mg/ml / 10 mg/ml injektioteste, suspensio

metyyliprednisoloniasettaatti
lidokaïinihydrokloridi

Lue tämä pakkausselostetiedot huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin, apteekkienkilokunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilokunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetiedossa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselostetiedotessa kerrotaan:

1. Mitä Depo-Medrol cum Lidocain on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta
3. Miten Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Depo-Medrol cum Lidocain -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Depo-Medrol cum Lidocain on ja mihin sitä käytetään

Depo-Medrol cum Lidocain sisältää metyyliprednisoloniasettaattia ja lidokaïinihydrokloridia. Metyyliprednisoloni kuuluu glukokortikoidien ryhmään ja lidokaïni on puudutusaine. Metyyliprednisoloni lievittää tulehdusoireita ja poistaa allergisia oireita, ja lidokaïni lievittää kipua.

Depo-Medrol cum Lidocain -valmisteet käytetään lyhytaikaiseen liitännäishoitoon (auttamaan potilaan akuutin sairauden tai sairauden pahanemisvaiheen yli) nivereumassa, limapussin tulehdussessa, jännetulehdussessa ja luun tulehdussissa (esim. tenniskynärpää).

Metyyliprednisolonia ja lidokaïinia, joita Depo-Medrol cum Lidocain sisältää, voidaan käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselostetiedossa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilokunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Depo-Medrol cum Lidocain -valmisteetta

Älä käytä Depo-Medrol cum Lidocain -valmisteetta

- jos olet allerginen metyyliprednisoloniille tai lidokaïinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luettelto kohdassa 6)
- jos sinulla on jokin sieni-infektio
- jos olet juuri saanut tai saamassa rokotteen, joka sisältää eläviä tai heikennettyjä eläviä taudinaihettuja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta, jos sinulla on

- lääkeaineallergia
- tuberkuloosi
- herpes simplex -viroksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus
- Cushingin oireyhtymä (avolisäkeperäinen lisämunuaiskuoren liikatoiminta)
- vesirokko tai tuhkarokko
- diabetes
- osteoporoosi (luukato)
- munuaisten vajaatoiminta
- skleroderma (autoimmuunisairaus, jota nimitetään myös systeemiseksi skleroosiksi), koska vakavan komplikaation, ns. skleroderman munuaiskriisiin, riski saattaa olla suurentunut
- jokin maksasairaus. Tällöin lääkäri saattaa joutua pienentämään annostustasi.
- haimatulehdus
- epäilty tai todettu feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)
- kilpirauhasen vajaatoiminta
- psykkisiä häiriöitä (vakava mielialahäiriö tai psykoosi)
- epilepsia
- myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)
- glaukooma (silmänpainetauti) tai silmäinfektio
- sydämen vajaatoiminta tai korkea verenpaine
- aiemmin sairastettu veritulppa (kuten laskimoveritulppa) tai alttius sille
- maha- tai pohjukaissuolihaava, tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus) tai umpipussitulehdus (divertikkelitulehdus)
- häiriöt sydämen johtumisjärjestelmässä, joka saa sydämen sykkimään ja sätelee sen sykkimisnopeutta ja rytmää
- nopea sydämen syke, heikko syke, sekavuus ja tajunnanmenetys (jotka voivat olla merkkejä epänormaalista veritilavuudesta eli hypovolemiasta)
- hidastunut sydämen syke (bradykardia).

Kortikosteroidit saattavat estää tulehdusoireiden havaitsemista ja heikentää vastustuskykyä.

Pitkääikainen päivittäinen glukokortikoidihoitotoiminta voi jarruttaa lapsen kasvua. Siksi sitä saa käyttää vain vaikeimpien sairauksien hoidossa.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Jos tarvitset Depo-Medrol cum Lidocain -hoidon aikana rokotuksen, kerro hoidostasi lääkäriille ennen rokottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Depo-Medrol cum Lidocain

Kerro lääkäriille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Depo-Medrol cum Lidocain voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja muut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Depo-Medrol cum Lidocain -valmisteen tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat:

- epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini)
- tuberkuloosilääkkeet (rifampisiini, isoniatsidi)
- antibiootit (troleandomysiini, klaritromysiini, erytromysiini)
- sienilääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli)
- tulehduskipulääke, asetyylisalisyylihappo
- veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet
- lihasrelaksantit (pankuroni, vekuroni)
- diabeteslääkkeet

- pahoinvointilääkkeet (aprepitantti, fosaprepitantti)
- HIV-viruslääkkeet (indinavippi)
- aromataasientyymin estäjät (aminoglutemidi)
- kalsiumestäjät (diltiatseemi)
- suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet (etinyliestradioli/noretisteroni)
- immuunivastetta vähentävät lääkkeet (siklosporiini, syklofosfamidi, takrolimus)
- diureetit (nesteenpoistolääkkeet)
- paikallispuidutteet (toimenpiteiden aikana kivunlievytkseen käytettävät lääkkeet)
- ryhmän IB rytmihäiriölääkkeet (sydämen poikkeavan rytmien säättämiseen käytettäviä lääkeitä).

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Depo-Medrol cum Lidocain -valmisten vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonavippi, kobisistaatti).

Greippimehun samanaikainen nauttiminen voi nostaa metyyliprednisolonin pitoisuutta veressä.

Jos käytät edellä mainittuja lääkeitä, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta.

Raskaus, imetyys ja he de lmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisten käytöstä saatavaa hyötyä on punnittava tarkasti mahdollisia äitiin tai sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia vasten ennen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Lääkäri päättää valmisten käytöstä raskauden tai imetyksen aikana.

Tämä lääkevalmiste sisältää säilytsaineena bentsyylialkoholia (ks. kohta Depo-Medrol cum Lidocain sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia).

Ajamineen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksesesi. Keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Depo-Medrol cum Lidocain -valmisten käyttö ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos sinulla ilmenee pyörorytystä, huimausta, väsymystä, liike- ja koordinaatiohäiriötä tai näköhäiriötä, älä aja tai käytä koneita.

Depo-Medrol cum Lidocain sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia

Bentsyylialkoholi

Tämä lääkevalmiste sisältää 8,7 mg bentsyylialkoholia per 1 millilitra liuosta ja vastaavasti 17,4 mg bentsyylialkoholia per 2 millilitraa liuosta mikä vastaa 8,7 mg/ml bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Bentsyylialkoholin käyttöön pienille lapsille on liittynyt vakavia haittavaikutuksia, kuten hengitysvaikeuksia (niin kutsuttu "gaspinglevyhtymä"). Älä käytä Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta vastasyntyneille lapsille (enintään 4 viikon ikäiselle) ilman lääkärin suositusta. Älä käytä Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta yli viikon ajan alle 3-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri ole näin neuvonut. Kysy lääkäriltä tai apteekkikenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus tai olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Natrium

Depo-Medrol cum Lidocain sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Depo-Medrol cum Lidocain -valmiste teta käytetään

Lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta injektiona tavallisesti niveleen tai jänteeseen.

Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen hoidettavan sairauden mukaan, esim.

- Niveleen annettava annos on nivelen koosta riippuen 4–80 mg (0,1–2 ml) 1, 5 tai useamman viikon välein
- Jänne- ja limapussivammojen hoitoon annos on 4–30 mg (0,1–0,75 ml).

Käyttö lapsille

Vakavissa tiloissa lapsille annettava annostus määräytyy tilan vaikeusasteen mukaan.

Jos saat enemmän Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta kuin sinun pitäisi

On erittäin epätodennäköistä, että läääkäri tai hoitohenkilökunta antaa sinulle liian suuren annoksen Depo-Medrol cum Lidocain -valmistetta.

Jos epäilet saaneesi liian suuren annoksen lääkettä, ilmoita asiasta heti lääkärille tai hoitohenkilökunnalle.

Jos olet saanut liian suuren annoksen tästä lääkettä, sinulla voi lidokaijin yliannostusoireina ilmetä mm. heitehuimausta, epätavallisia tuntemuksia suun ympäryksen ihossa, kielen tunnottomuutta, pyörityystä, kuulo- tai näköhäiriötä, lihasten vapinaa tai nykimistä, kouristuskohtauksia, tajunnanmenetys, hengityksen häiriintymistä, matala verenpaine, liian nopeat tai hitaat sydämenlyönnit, epäsäännölliset sydämenlyönnit tai sydänpysähdyt.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset (esiintymistihes tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- elimistön puolustuskyvyn heikkenemisestä aiheutuvat infektiot, muut infektiot
- veren valkosolujen määrän nousu
- lääkeyliherkkyysreaktiot (mukaan lukien vakavat yliherkkyysreaktiot)
- Cushingin tautia muistuttava tila (mm. painonnousu ja kasvojen pyörästyminen), aivolisäkkeen (aivojen alla sijaitseva rauhanen) tuottamien hormonien vähentynyt eritys, steroidien käytön lopettamisen yhteydessä esiintyvä vieroitusoireyhtymä (mm. ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, päänsärky, kuume, nivelkipu, hilseily, lihaskipu, painonlasku ja/tai verenpaineen lasku)
- aineenvaihduntaan liittyvä elimistön liiallinen happamuus, natriumin ja nesteen kertyminen elimistöön, kaliumin puutteesta johtuva veren liiallinen emäksisyys, veren rasvahäiriö, sokerien sietokyvyn heikkeneminen, insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tarpeen lisääntyminen diabeetikoilla, rasvakasvainten tai rasvakudoksen runsas esiintyminen epätavallisissa paikoissa, ruokahalun lisääntyminen (voi johtaa painon nousuun),

- mielialan häiriöt (mukaan lukien masentuneisuus, euforinen mieliala, mielialan horjuvuus, psyykkinen riippuvuus, itsemurha-ajatukset), psykoottiset häiriöt (mukaan lukien mania, harhaluulot, aistiharhat ja skitsofrenia), persoonaallisuuden muutos, sekavuustila, ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut, epänormaali käytös, unettomuus, ärtyvyys, hermostuneisuus
- kallonsisäisen paineen kohoaaminen, tajunnanmenetys, kouristuskohtaukset, muistinmenetys, häiriöt kognitiivisissa toiminnossa esim. havaitsemisessa, oppimisessa ja muistissa, vapina, uneliaisuus, heikentyt tuntoaisti, heitehuimaus, päänsärky
- silmän verkkokalvon ja suonikalvon sairaus, kaihi, kohonnut silmänpaine, silmien ulospullistuminen, kahtena näkeminen, näön hämärtyminen
- kiertohuimaus, korvien soiminen
- sydänpysähdyks, sydämen vajaatoiminta sille alttiilla potilailla, sydämen harvalyöntisyys, poikkeava sydämen rytm (sydämen rytmihäiriöt)
- verenkierron romahtaminen, lisääntynyt veren hyytyminen, verenpaineen liiallinen aleneminen, korkea verenpaine, ihan lämpeneminen ja punoitus
- hengityksen lamaantuminen, keuhkoveritulppa, hikka, hengitysteiden supistumisesta aiheutuva hengitysvaikeus (bronkospasmi), hengitysvaikeudet tai hengityksen vaivalloisuus (dyspnea)
- mahana ja ruoansulatuselimistön oireet (mm. mahalaukun tai pohjukaissuolen haava, joka voi puhjeta ja vuotaa, haimatulehdus, ruokatorvitulehdus, oksentelu)
- iho-oireet, mm. kohtauksittain esiintyvä paikallinen ihoturvotus (angioedeema), liikakarvoitus, pienet verenpurkaumat, mustelmaherkkyys, ihottuma, liikahikoilu, ihan arpajuovat, kutina, nokkosihottuma, akne, ihan pigmenttihäiriöt, ihovaario, kasvojen turpoaminen (kasvojen edeema)
- lihasheikkous, lihaskipu, lihassairausrus, lihasten surkastuminen, luukato (osteoporoosi), luukuolio, patologiset murtumat, hermosairaudesta johtuva nivelsairaus, nivelkipu, kasvun hidastuminen lapsilla, lihasten nykiminen, injektion jälkeinen kipu (tilapäinen yltynyt kipu injektiokohdassa)
- lisämuunaisyimen kasvaimaan liittyvä kriisi
- epäsäännöllinen kuukautiskierto
- haavan paranemisen hidastuminen, turvotus, väsymys, huonovointisuus, ihoreaktiot antopaikassa, kylmän- ja kuuman tunne
- kohonnut silmänpaine, heikentyt hiilihydraattien sietokyky, kalsiumin määrän lisääntyminen virtsassa, muutokset veriarvoissa, ihotestireaktioiden heikkeneminen
- selkärangan kompressiomurtuma, jännerepeämä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Depo-Medrol cum Lidocain -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tästä lääkettä ulkopakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellä suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Depo-Medrol cum Lidocain sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat metyyliprednisolonia setaatti ja lidokaiinihydrokloridi. Yksi millilitra injektionestettä sisältää 40 mg metyyliprednisolonia setaattia ja 10 mg lidokaiinihydrokloridia.
- Muut aineet ovat:
Makrogoli 3350, bentsyylialkoholi (E1519), natriumkloridi, myristyylipyrokloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lisätietoa bentsyylialkoholista ja natriumista, ks. kohta 2 ”Depo-Medrol cum Lidocain sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, maitomainen suspensio.

Lasinen injektiopullo: 1 ml ja 2 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A.,
Puurs, Belgia

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 31.10.2024

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Käyttöohje

Depo-Medrol cum Lidocain 40 mg/ml / 10 mg/ml injektioneste, suspensio

Varotoimet

Depo-Medrol cum Lidocainin toistuva annostelu samasta injektiopullossa vaatii erityistä huolellisuutta kontaminaation välttämiseksi. Vaikka injektiopullo on sterili, sen moniannoskäyttö voi aiheuttaa kontaminaation, ellei tiukkaa aseptiikkaa noudateta. Moniannoskäyttöön tarkoitettun injektiopullon tulppa tulisi puhdistaa povidonijodiliuoksella tai vastaanvalla ennen sisällön aspiroimista. Erityninen huolellisuus, esimerkiksi steriiliien kertakäyttöruiskujen ja -neulojen käyttö, on vältämätöntä.

Yhteensopimattomuudet

Mahdollisten fysikaalisten yhteensopimattomuuksien vuoksi steriliä Depo-Medrol cum Lidocain - injektionestettä ei saa laimentaa eikä sekoittaa muihin liuoksiin.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet

Valmiste ei ole tarkoitettu annettavaksi laskimonsisäisenä injektiona eikä infuusiona.

Valmistetta ei saa antaa intratekaalisesti eikä epiduraalisesti.

Tarkista injektioneste hiukkas- ja värimuutosten varalta silmämääräisesti ennen käyttöä.

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Älä käytä valmistetta kestoajan päätyttyä.

Hävitä käytämätön valmiste tai jälte paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Bipackse del: Information till patienten

Depo-Medrol cum Lidocain 40 mg/ml/10 mg/ml injektionsvätska, suspension

metylprednisolonacetat
lidokainhydroklorid

Läs noga igenom den na bipackse del innan du börjar använda detta läke medel. Den inne håller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart till dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den na bipackse del finns information om följande :

1. Vad Depo-Medrol cum Lidocain är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol cum Lidocain
3. Hur du använder Depo-Medrol cum Lidocain
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Depo-Medrol cum Lidocain ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Depo-Medrol cum Lidocain är och vad det används för

Depo-Medrol cum Lidocain innehåller metylprednisolonacetat och lidokainhydroklorid. Metylprednisolon ingår i gruppen glukokortikoider och lidokain är bedövningsmedel. Metylprednisolon lindrar infektioner och minskar på allergiska symtom, och lidokain lindrar smärta.

Depo-Medrol cum Lidocain används vid kortvarig behandling (för att hjälpa patienten vid akut sjukdom eller sjukdomsattack) av ledgångsreumatism, slemsäcksinflammation, seninflammation och beninflammation.

Metylprednisolon och lidokain, som Depo-Medrol cum Lidocain innehåller, kan även användas vid behandling av andra sjukdomar än de som nämns i den na bipacksedel. Vid behov fråga råd av din läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal och fölж alltid de instruktioner du fått av dem.

2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol cum Lidocain

Använd inte Depo-Medrol cum Lidocain

- om du är allergisk mot methylprednisolon eller lidokain eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du lider av en svampinfektion
- om du nyss har vaccinerats eller skall vaccineras med vaccin som innehåller levande eller försvagade patogener.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Depo-Medrol cum Lidocain ifall du har

- läkemedelsallergier
- tuberkulos
- hornhinneinflammation orsakad av herpes simplex-virus
- Cushings syndrom (överproduktion av kortisol i binjurebarken)
- vattkoppor eller mässling
- diabetes
- osteoporos (benskörhet)
- njursvikt
- sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom), eftersom risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris kan vara förhöjd
- någon leversjukdom. Läkaren kan vid behov minska på doseringen.
- bukspottskörtelinflammation
- misstänkt eller diagnostiserad feokromocytom (tumör i binjuremärgen)
- sköldkörtelunderfunktion
- psykiska problem (allvarligt förstämmningssyndrom eller psykos)
- epilepsi
- myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar svaghet i musklerna)
- glaukom (förhöjt ögontryck) eller ögoninflammation
- hjärtsvikt eller högt blodtryck
- tidigare haft en blodpropp (som en venös blodpropp) eller du är benägen för det
- magsår i magsäcken eller tolvfingertarmen, inflammatorisk tarmsjukdom (blödande tjocktarmsinflammation) eller inflammation i divertikeln (divertikulit)
- problem med hjärtats retledningssystem som får hjärtat att slå och reglerar dess frekvens och rytm
- hjärtklappning, svag puls, förvirring och medvetlösthet (som kan vara tecken på onormalt låg blodvolym dvs. hypovolemi)
- längsammare hjärtfrekvens (bradykardi).

Kortikosteroider kan hindra att symtom av infektioner märks och försämra motståndskraften.

Långvarig daglig användning av glukokortikoider kan hämma barnets tillväxt. Därför får glukokortikoider användas bara vid behandlingen av de allvarligaste sjukdomarna.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Berätta för läkaren om din behandling med Depot-Medrol cum Lidocain, om du bör vaccineras under den tiden du vårdas.

Andra läkemedel och Depo-Medrol cum Lidocain

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Depo-Medrol cum Lidocain kan ha en inverkan på andra läkemedel och andra läkemedel kan ha en inverkan på Depo-Medrol cum Lidocain. Sådana läkemedel är:

- epilepsiläkemedel (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
- tuberkulosläkemedel (rifampicin, isoniazid)
- antibiotika (troleandomycin, klaritromycin, erytromycin)
- svampmediciner (ketokonazol, itrakonazol)
- antiinflammatoriska mediciner, acetylsalicylsyra
- läkemedel som hämmar blodets koagulation
- muskelrelaxanter (pankuron, vekuron)
- diabetesläkemedel

- läkemedel mot illamående (aprepitant, fosaprepitant)
- läkemedel mot HIV-virus (indinavir)
- hämmare av enzymet aromatas (aminoglutetimid)
- kalciumantagonister (diltiazem)
- orala preventivmedel (etinylestradiol/noretisteron)
- läkemedel som försvagar immunförsvaret (ciklosporin, cyklofosfamid, takrolimus)
- diuretika (vätskeutdrivande läkemedel)
- lokalbedövningsmedel (smärtstillande läkemedel som används under ingrepp)
- antiarytmika klass IB (läkemedel som används för att kontrollera onormal hjärtfrekvens).

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Depo-Medrol cum Lidocain och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Samtidig intagning av grapejuice kan höja halten av metylprednisolon i blodet.

Diskutera med din läkare före användningen av Depo-Medrol cum Lidocain om du använder ovan nämnda läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.

Nyttan av preparatet bör noga övervägas mot preparatets eventuella biverkningar för mamman eller fostret före användning av preparatet under graviditet eller amning. Läkaren bestämmer om användningen av preparatet under graviditet och amning.

Depo-Medrol cum Lidocain innehåller bensylalkohol som ett konserveringsmedel (se Depo-Medrol cum Lidocain innehåller bensylalkohol och natrium).

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Depo-Medrol cum Lidocain påverkar vanligtvis inte förmågan att köra eller förmågan att använda maskiner. Ifall du känner svindel, yrsel, trötthet, upplever problem med rörelser eller koordination eller har synrubbningar, bör du inte köra eller använda maskiner.

Depo-Medrol cum Lidocain innehåller bensylalkohol och natrium

Bensylalkohol

Depo-Medrol cum Lidocain innehåller 8,7 mg bensylalkohol per ml lösning, och respektive 17,4 mg bensylalkohol per 2 ml lösning, motsvarande 8,7 mg/ml bensylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar såsom andningssvårigheter hos små barn. Depo-Medrol cum Lidocain ska inte ges till nyfödda barn (upp till 4 veckors ålder) om inte läkare har ordinerat det. Depo-Medrol cum Lidocain ska inte användas längre än 1 vecka till små barn (yngre än 3 år) om inte läkare har rekommenderat det. Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal. Användning av stora mängder bensylalkohol kan nämligen lagras i kroppen vilket resulterar i en ökad mängd syra i blodet (metabolisk acidosis).

Natrium

Depo-Medrol cum Lidocain innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Depo-Medrol cum Lidocain

Läkaren eller vårdpersonalen injicerar Depo-Medrol cum Lidocain in i leden eller i senor.

Din läkare bestämmer den rätta dosen för dig utgående från din sjukdom, t.ex.

- in i leden ges, beroende på ledens storlek, 4–80 mg (0,1–2 ml) med 1, 5 eller flera veckors mellanrum
- för skador i senor och slemsäck ges 4–30 mg (0,1–0,75 ml).

Användning för barn

Vid allvarliga fall bestäms dosering enligt barnets tillstånd.

Om du har fått för stor mängd av Depo-Medrol cum Lidocain

Det är ytterst osannolikt att läkaren eller vårdpersonalen ger dig en för stor dos av Depo-Medrol cum Lidocain.

Om du tror att du har fått för stor mängd läkemedel kontakta din läkare eller vårdpersonalen omedelbart.

Om du har fått för stor dos av detta läkemedel, kan du uppleva överdoseringssymtom av lidokain bl.a. svindel, ovanlig känsla i huden kring munnen, domningar i tungan, svimmingskänsla, hörsel- eller synstörningar, muskeldarrningar, muskelryckningar, krampfall, medvetlöshet, andningsstörningar, lågt blodtryck, för snabba eller för långsamma hjärtslag, oregelbundna hjärtslag eller hjärtstillestånd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare får inte dem.

Biverkningar (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)

- infektioner som uppstår p.g.a. nedsatt immunförsvar, andra infektioner
- ökning av vita blodkroppar
- reaktioner p.g.a. läkemedelsöverkänslighet (även allvarliga)
- tillstånd liknande Cushings syndrom (bl.a. viktökning, månansikte), minskad sekretion av hormoner som produceras av hypofysen (en körtel under hjärnan), abstinenssyndrom vid avslutning av steroidanvändning (bl.a. nedsatt aptit, illamående, kräkningar, sömnighet, huvudvärk, feber, ledvärk, mjäll, muskelvärk, viktnedgång och/eller sänkt blodtryck)
- metabolic asidosis, ansamling av natrium och vätska i kroppen, kaliumbrist som leder till att blodet blir alltför alkaliskt, dyslipidemier, minskad tolerans för socker, ökat behov av insulin eller användning av orala diabetesläkemedel hos diabetiker, förekomsten av fettumörer eller fettvävnad på ovanliga ställen, ökad aptit (kan leda till viktökning)
- affektiva störningar (inklusive depression, eufori, omväxlande sinnestillstånd, psykisk addiktion, självmordstankar), psykotiska störningar (inklusive mani, vanföreställningar, hallucinationer och schizofreni), förändringar i personligheten, förvirringstillstånd, ångest, omväxlande humör, onormalt uppförande, sömnlöshet, irritabilitet, nervositet

- förhöjt intrakraniellt tryck, medvetslöshet, kramper, minnesförluster, störningar i kognitiva funktioner, bl.a. i att iakttaga, lära sig och minnas, darrning, sömnighet, försämrat känsel, svindel, huvudvärk,
- sjukdom i näthinnan och åderhinnan, starr, förhöjt ögontryck, utstående ögonglober, dubbelseende, dimsyn
- yrsel, öronsusning
- hjärtstopp, hjärtsvikt hos patienter som har benägenhet för det, bradykardi, onormal hjärtfrekvens (hjärtarytmier)
- blodcirkulationkollaps, ökad levring av blodet, för lågt blodtryck, förhöjt blodtryck, värme och rodnad i huden
- förlamad andning, blodpropp i lungan, hicka, andnöd orsakad av att luftvägarna drar ihop sig (bronkospasm), svårighet att andas eller ansträngd andning (dyspné)
- symptom i magen och i matspjälkningsorganen (bl.a. sår i magsäcken eller i tolvfingertarmen som kan perforera och blöda, bukspottkörtelinflammation, infektion i mästrupen, kräkning)
- hudsymtom, bl.a. lokala svullnader i huden (angioödem), ökad hårtillväxt, små åderbråck, benägenhet för blåmärken, utslag, ökad svettning, ärrstrimmor på huden, kåda, urtikaria, acne, pigmentförändringar, hudskada, svullnad i ansiktet (ansiktsödem)
- muskelsvaghet, muskelvärk eller muskelsjukdom, muskelatrofi, benskörhett (osteoporos), benvävsdöd, patologiska benbrott, ledsjukdom p.g.a. nervsjukdom, ledvärk, hämmad tillväxt hos barn, muskelknyckar, uppblössande smärta efter injektion (tillfällig ökad smärta vid injektionsstället)
- kris med tumör i binjuremärgen
- oregelbunden menstruation
- förlängd sårläkningstid, ödem, trötthet, illamående, hudreaktioner vid administreringsstället, känslor av kallt och varmt
- förhöjt ögontryck, försämrad tolerans av kolhydrater, ökad halt av kalcium i urinen, förändringar i blodvärdena, försvagade reaktioner i hudtest
- kompressionsfrakturer i ryggraden, bristningar i senor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Depo-Medrol cum Lidocain ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på ytter förpackningen eller etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är metylprednisolonacetat och lidokainhydroklorid. En milliliter injektionsvätska innehåller 40 mg metylprednisolonacetat och 10 mg lidokainhydroklorid.
- Övriga innehållsämnen är:
Makrogol 3350, bensylalkohol (E1519), natriumklorid, myristyl- γ -pikolinklorid, vatten för injektionsvätskor.

Ytterligare information om bensylalkohol och natrium, se avsnitt 2 ”Depo-Medrol cum Lidocain innehåller bensylalkohol och natrium”.

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, mjölkaktig suspension.

Injektionsflaska av glas: 1 ml och 2 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy
Datagränden 4
00330 Helsingfors

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A., Puurs, Belgien

Denna bipackse del ändrades senast 31.10.2024

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Bruksanvisning

Depo-Medrol cum Lidocain 40 mg/ml / 10 mg/ml injektionsvätska, suspension

Försiktighetsåtgärder

Upprepad administrering av Depo-Medrol cum lidocain från den samma injektionsflaskan fodrar särskild försiktighet för att undvika kontamination. Även om injektionsflaskan är steril, flerdosanvändning kan ge upphov till kontamination ifall strängt aseptisk inte följas. Proppen på injektionsflaskan för flerdosanvändning borde rengöras med povidonjodidlösning eller motsvarande lösningar före aspiration av innehållet.

Särskild försiktighet, till exempel användning av sterila engångssprutor och -nålor, är nödvändigt.

Blandbarhet

På grund av möjliga fysikaliska inkompatibiliteter skall steril Depo-Medrol cum lidocain injektionsvätska inte utspädas eller blandas med andra lösningar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Detta preparat är inte avsett för administrering genom intravenös injicering eller infusion.

Läkemedlet får inte ges intratekalt eller epiduralt.

Före användning kontrollera injektionsvätskan på ögonmått för möjliga partikel- eller färgförändringar.
Skaka väl före användning.

Använd ej läkemedlet efter utgångsdatumet.

Kassera oanvänt läkemedel och avfall enligt gällande lokala anvisningar.