

Pakkausseloste: Tie toa potilaalle

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletit

karvediloli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysytävää, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Carveratio on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carveratiota
3. Miten Carveratiota käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Carveration säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Carveratio on ja mielin sitä käytetään

Carveratio kuuluu alfa- ja beetasalpaajien lääkeryhmään. Carveratiota käytetään korkean verenpaineen ja rasitusrintakivun (angina pectoris) hoitoon. Carveratiota käytetään myös sydämen vajaatoiminnan lisähoiton.

Karvedilolia, jota Carveratio sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkikenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carveratiota

Älä käytä Carveratiota

- jos olet **allerginen** karvedilolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on **hoitamaton tai huonossa hoitotapainossa oleva sydämen vajaatoiminta** tai tietynryppinen **sydämen johtumishäiriö** (ns. toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos, jonka korjaamiseksi sinulle ei ole asennettu sydämentahdistinta tai sinulla on ns. sairas sinus -oireyhtymä).
- jos sinulla on **maksasairaus**, joka aiheuttaa **ongelmia**.
- jos **pulssi on hyvin hidas (alle 50 lyöntiä minuutissa)** tai **verenpaineesi on hyvin matala**.
- jos **sydämesi toiminta** on vaikeasti **heikentynyt** (kardiogeeninen sokki).
- jos sinulla on vakava **elimistön hoppo-emäs tasapainon häiriö** (metabolinen asidoosi, asidemia).
- jos sinulla on **astma** tai jokin muu **hengitystiesairaus**, johon liittyy taipumusta hengitysteiden äkilliseen, supistelun aiheuttamaan ahtautumiseen (esim. keuhkohtautauti).
- jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia (akuutti **keuhkoembolia** eli keuhkoveritulppa).
- jos sinulla on vähän harvinainen angina pectoriksen muoto (**Prinzmetalin angiina**).
- jos sinulla on keuhkosairauden aiheuttama sydämen vajaatoiminta (**cor pulmonale**).
- jos sinulla on lisämuunaiseten liikatoiminta (**feokromosytooma**), johon et saa lääkehoitoa.

- jos käytät **MAO:n estääjää** (esim. moklobemidia) (lukuun ottamatta MAO-B:n estääjää).
- jos sinua hoidetaan laskimonsisäisillä **verapamiili-** tai **diltiats e emipistoksilla**, tai muilla sydämen rytmihäiriön hoitoon tarkoitetuilla lääkeainepistoksilla.
- jos **imetät**.

Varoitukset ja varotoimeet

Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Carveratiota

- jos sinulla on **sydämen vajaatoiminta**, johon liittyy
 - matala verenpaine,
 - **sydämen heikentynyt veren- ja hape ns aanti** (iskeeminen sydänsairaus) ja **valtimoiden kovettuminen** (ateroskleroosi),
 - ja/tai **munuaissairaus**.
- Tällöin munuaisten toimintaa on tarkkailtava ja annoksen pienentäminen voi olla tarpeen.
- jos sinulla on ollut **sydänkohtaus**. Tämän tilan asianmukaisesta hoidosta on huolehdittava ennen Carveratio-hoidon aloittamista.
- jos sinulla on tiettytyyppinen **häiriö sydämen johtumisjärjestelmässä** (ns. ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos)
- jos verenpaineesi on koholla jostain elimellisestä syystä
- jos sairastat **diabete sta**. Carveratio-hoito saattaa peittää liian pienet verensokeripitoisuuden oireet, ja verensokeripitoisuutta on siksi seurattava säännöllisesti.
- jos **kätesi ja jalkojesi verenkierto on erittäin huono**
- jos samanaikaisesti käytät lääkkeitä sydämen vajaatoiminnan (digitalisglykosidit) tai rytmihäiriöiden hoitoon (esim. verapamiili, diltiatseemi)
- jos verenpaineesi on alhainen (ortostaattinen hypotensi)
 - äkillinen, tulehdusellinen sydänsairaus
 - sydänläppien tai ulosvirtauksen ahtauma
 - loppuvaiheen ääreisvaltimotauti
- jos sinulla on labiili tai sekundaarinen hypertensio (kohonnut verenpaine)
- jos samanaikaisesti käytät jotakin muuta verenpainetta alentavaa lääkettä (alfa1-reseptorin salpaajat tai alfa2-reseptorin agonistit)
- jos sinulla on **Raynaud' n oireyhtymä** (sormet tai varpaat alkavat ensin sinertää, muuttuvat sitten vaaleaksi ja lopulta punoittavaksi ja samalla esiintyy kipua). Carveratio voi pahentaa näitä oireita.
- jos sairastat **kilpirauhasen liikatoimintaa**, jolloin kilpirauhashormonia erittyy normaalina enemmän. Carveratio voi peittää nämä oireet.
- jos käytät Carveratiota ja olet menossa nukutusainetta vaativaan **leikkaustoimenpiteeseen**, kerro lääkityksestä nukutuslääkärille hyvissä ajoin ennen toimenpidettä
- jos sinulla on hyvin **hidas pulssi (alle 55 lyöntiä minuutissa)**
- jos sinulla on ollut vakava **allerginen reaktio** (esim. hyönteisenpiston tai ruoka-aineen aiheuttama) tai jos saat **siedätyshoitoa** tai olet menossa siedätyshoitoon. **Carveratio voi heikentää tällaisen allergisten reaktioiden hoitoon käytettävien lääkkeiden tehoa.**
- jos sinulla on **psoriaasi**
- jos sinulla on vaikea ihoreaktio [esim. toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN) tai Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS)]
- jos käytät **piilolinssejä**, sillä Carveratio voi vähentää kyynelnesteen eritystä.

Lapset ja nuoret

Tiedot karvedilolin tehosta ja turvallisuudesta alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ovat puutteelliset. Nämä ollen Carveratio-lääkettä ei pidä käyttää tämän potilaaryhmän hoidossa.

Läkkääät potilaat

Läkkääät potilaat saattavat olla tavallista herkempia karvedilolille, joten he tarvitsevat tavallista huolellisempaa seurantaa.

Muut lääkevalmis teet ja Carveratio

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Muu samanaikainen lääkitys voi vaikuttaa Carveration tehoon. Carveratio voi myös vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.

Lääkärin on **erityisen tärkeää** tietää, jos käytät jo jotakin seuraavista lääkkeistä:

- **Digoksiini tai digitoksiini** (sydämen vajaatoiminnan hoitoon).
- **Insuliini tai suun kautta otettavat diabetesi lääkkeet** (verensokeria alentavat lääkkeet), sillä näiden sokeripitoisuutta alentava vaikutus saattaa tehostua ja alhaisen verensokerin aiheuttamat oireet peittää.
- **Rifampisiini** (tuberkuulosin hoitoon käytettävä antibiootti).
- **Karbamatsепиини** (epilepsian hoitoon).
- **Flukonatsoli** (sienitautilääke).
- **Paroksetiini, fluoksetiini, bupropioni** (masennuslääkkeitä).
- **Reserpipiiniä, guanetidiinia, metyldopaa ja guanfasiinia** sisältävät lääkkeet sekä monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjät (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä), sillä nämä lääkkeet voivat hidastaa sydämen rytmää entisestään.
- **Siklosporiini tai takrolimus i** (immunijärjestelmän heikentämiseen käytetty lääke, jota käytetään hylkimisen estoon elinsiirtojen jälkeen ja myös mm. tiettyjen reumasairauksien ja ihotautien hoitoon).
- sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. **verapamiili, diltiats e emi, kinidiini, amiodaroni**).
- **Klonidiini** (verenpainelääke).
- **Sympatomime tit** (sympaattisen hermoston toimintaa lisäävät lääkkeet).
- Hengitysvaikeuksien hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. **salbutamoli, formoteroli**).
- **Dihydropyridiinit** (kohonneen verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon käytettävä lääke).
- **Muut verenpainetta laskevat lääkkeet.** Carveratio voi voimistaa muiden samanaikaisesti käytettyjen verenpainelääkkeiden (kuten **alfa₁-reseptoriantagonistien ja nitraattien**) vaikutusta ja sellaisten lääkkeiden vaikutusta, joiden haittavaikutuksena esiintyy verenpaineen laskua, kuten **barbituraatit** (epilepsialääkkeitä), **fentiatsiinit** (psykoosilääkkeitä), **trisykliset maseenrus lääkkeet ja verisuonia laajentavat lääkkeet**.
- **Neuromuskulaariset salpaajat** (lihasjännitystä vähentävät lääkkeet).
- **Ergotamiini** (migreenilääke).
- **Anestesia-aineet** (nukutuslääkkeet).
- **Tietty kipulääkkeet** (tulehduskipulääkkeet), **estrogeenit** (hormoneja) ja **kortikosteroidit** (lisämuunaiskuoren tuottamia hormoneja), sillä ne voivat joissakin tapauksissa heikentää Carveration verenpainetta laskevaa vaikutusta.
- **Sinakalsetti** (lisäkilpirauhasen sairauksiin käytetty lääke).

Carveratio ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Carveratio-lääkkeen otto samaan aikaan tai lyhyen ajan sisällä greipin tai greippimehun nauttimisesta on vältettävä hoidon alussa. Greippi ja greippimehu voivat suurentaa lääkkeen vaikuttavan aineen (karvedilolin) pitoisuutta veressä ja siten johtaa arvaamattomiin haittavaikutuksiin.

Alkoholin nauttiminen Carveratio-hoidon aikana on rajoitettava, sillä alkoholi voi vaikuttaa Carveration vaikutustapaan.

Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekrista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmiste saattaa vahingoittaa sikiötä. Carveratiota saa käyttää raskauden aikana vain, jos se on lääkärin mielestä tarpeellista. Keskustele siksi lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat Carveration käytön raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittykön karvediloli äidinmaitoon. Siksi Carveratiota ei saa käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon alussa, annosta suurennettaessa, lääkevalmistetta vaihdettaessa tai alkoholin käytön yhteydessä saattaa esiintyä huimausta ja väsymystä. Ei tiedetä, vaikuttaako karvediloli ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn silloin, kun sopiva annostus on löytynyt. Jos sinua huimaa tai heikottaa tabletien ottamisen yhteydessä, vältä autolla ajamista ja tarkkaavaisuutta vaativaa työtä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkien henkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Carveratio sisältää laktoosia

Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

3. Miten Carveratiota käytetään

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkärltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos sinusta tuntuu, että Carveration vaikutukset ovat liian voimakkaita tai liian heikkoja, kysy neuvoa lääkärltä tai apteekista.

Niele tabletit vähintään puolikkaan vesilasillisen kera. Voit ottaa tabletit ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden tulee kuitenkin ottaa tabletit ruokailun yhteydessä, jotta nopeasti pystyasentoon noustessa ilmenevä huimauksen riski vähennisi.

Tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Carveratio-tableteista on saatavana seuraavat vahvuudet:

6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg.

Korkea verenpaine:

Aikuiset:

Tavanomainen annos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kahden ensimmäisen päivän ajan ja sen jälkeen kaksi 12,5 mg:n Carveratio-tablettia (mikä vastaa 25 mg karvedilolia) kerran vuorokaudessa. Tätä annostusta varten on saatavana muita annosvahvuuksia karvedilolista.

Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa asteittain. Annosnoston välä pitää olla vähintään kaksi viikkoa. Suositeltu enimmäisannos on 50 mg vuorokaudessa.

Iäkkääät potilaat:

Suositusannos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kerran vuorokaudessa.

Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa asteittain. Annosnoston välä pitää olla vähintään kaksi viikkoa. Suositeltu enimmäisannos on 50 mg vuorokaudessa.

Rasitusrintakipu:

Aikuiset:

Tavanomainen annos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan ja sen jälkeen kaksi 12,5 mg:n Carveratio-tablettia (mikä vastaa 25 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa. Tätä annostusta varten on saatavana muita Carveration annosvahvuuksia.

Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa asteittain. Annosnoston välä pitää olla vähintään kaksi viikkoa. Suositeltu enimmäisannos on 100 mg vuorokaudessa.

Iäkkääät potilaat:

Tavanomainen annos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan ja sen jälkeen kaksi 12,5 mg:n Carveratio-tablettia (mikä vastaa 25 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisannos on 50 mg vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminta:

Tavanomainen aloitusannos on 3,125 mg karvedilolia kahdesti vuorokaudessa kahden viikon ajan. Annosta voidaan suurentaa asteittain, tavallisesti kahden viikon välein.

Annoksen suurentaminen tai pienentäminen saattaa kuitenkin olla tarpeen. Tällöin lääkäri kertoo, miten annostasi muutetaan.

Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 25 mg kahdesti vuorokaudessa alle 85 kg painaville potilaille ja 50 mg kahdesti vuorokaudessa yli 85 kg painaville potilaille, jos sydämen vajaatoiminta ei ole vaikea. Jos annos suurennetaan 50 mg:aan kahdesti vuorokaudessa, varovaisuutta on noudatettava ja lääkärin on seurattava tilannetta tarkasti.

Jos otat enemmän Carveratiota kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääketötä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Yliannoksen oireita voivat olla mm. liiallisesta verenpaineen laskusta johtuva pyörrytys, hidas sydämen sykettiheys ja vakavissa tapauksissa ajoittainen sydämenlyöntien poisjäänti. Hengitysvaikeuksia, hengitysteiden seinämien kouristuksia, huonovointisuutta, tajunnantason laskua ja kouristuskohtauksia saattaa esiintyä.

Jos unohdat ottaa Carveratiota

Jos unohdat ottaa yhden (tai useamman) annoksen, ota seuraava annos ajallaan. Älä otta kaksinkertaista (tai suurempaa) annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen tai -annokset.

Jos lopetat Carveration käytön

Älä lopeta hoitoa äkillisesti äläkä muuta annosta, ellei lääkäri määrää toisin. Hoito tulee lopettaa vähitellen kahden viikon kuluessa. Äkillinen lopettaminen voi pahentaa oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Suurin osa haittavaikutuksista riippuu annoksen koosta ja häviää, kun annosta pienennetään tai kun hoito lopetetaan. Hoidon alussa voi esiintyä joitakin haittavaikutuksia, jotka häviävät itsestään hoitoa jatketaessa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista

- rintakivut yhdessä samanaikaisen hengenahdistuksen, hikoilun ja pahoinvoinnin kera (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 100:sta).
- vakavat ihoreaktiot, kuten ihottuma, punoitus, rakkulat huulissa, silmien ympärillä tai suussa, ihmisen hilseily/kuoriutuminen (monimuotoisen punavihoittuman oireita), haavaumat suussa, huulissa ja ihossa (Stevens-Johnsonin oireyhtymän merkkejä), uloimman ihokerroksen irtoaminen alemmista kerrosista koko kehon alueella (toksisen epidermaalisen nekrolyysin merkkejä) (yleisyys: hyvin harvinainen).

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 ihmisellä 10:stä):

- huimaus
- päänsärky
- sydämen vajaatoiminta
- alhainen verenpaine
- voimattomuus.

Yleiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 10:stä):

- keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, ylempien hengitysteiden infektiot
- virtsatietulehdus
- alhainen veren punasolujen määrä
- painonousu
- suurentuneet kolesterolipitois uudet
- diabetesta sairastavien verensokeritasapainon heikkeneminen
- masennus, masentunut mieliala
- näköhäiriöt
- vähentynyt kynnelnesteen eritys, silmien ärsytys
- hidastunut sydämen syketiheys
- turvotus (mm. koko elimistön tai sen eri osien turvotus), nesteylimäärä, elimistön veritila vuuden kasvu
- huimaus nopeasti seisomaan nostessaan
- pyörtyminen
- verenkierto-ongelmat (oireina mm. kylmät kädet ja jalat), valtimoiden kovettuminen (ateroskleroosi), Raynaud'n oireyhymän aiheuttamien oireiden paheneminen (sormet tai varpaat alkavat ensin sinertää, muuttuvat sitten vaaleiksi ja lopulta punoittaviksi ja samalla esiintyy kipua) tai katkokävelyn (säärikipu, joka pahenee kävellessä) paheneminen
- astma ja hengitysvaikeudet
- nesteen kertyminen keuhkoihin
- ripuli
- sairaudentunne, pahoinvoindi, oksentelu, vatsakivut, ruoansulatusvaivat
- kipu (esim. kässissä ja jaloissa)
- akuutti munuaisten vajaatoiminta sekä munuaistoiminnan häiriöt potilailla, jotka sairastavat valtimonkovettumatautia ja/tai joiden munuaisten toiminta on ennestään heikentynyt
- virtsaamisvaikeudet.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 100:sta):

- unihäiriöt
- sekavuuus, aistiharhat
- painajaisunet
- outo tunne koko kehossa
- sydämen johtumishäiriö, angina pectoris (rasitusrintakipu)
- tietyt ihoreaktiot (esim. allerginen ihottuma, nokkosihottuma, kutina ja ihotulehdus, lisääntynyt hikoilu, psoriaasin tai punajäkälän kaltaiset ihovauriot)
- ummetus
- impotenssi.

Harvinaiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 1 000:sta):

- verihiuataleniuKKUUS (trombosytopenia)
- nenän tukkoisuus
- suun kuivuminen.

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 10 000:sta, mukaan lukien yksittäiset tapaukset):

- valkosolujen määrän väheneminen
- psykoosi
- allergiset reaktiot
- muutokset maksan toimintakoeearvoissa
- virtsanpidätskyvyttömyys naisilla.

Yleisyyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esintyyvyyden arviointiin)

- hiustenlähtö.

Beetasalpaajäläkkeet saattavat laukaista piilevän diabeteksen.

Sinoatriaalinen katkos (puuttuva impulssi sinussolmukkeesta, eli sydämen omasta tahdistimesta, joka säätelee sydämen supistumista ja lyöntirytmää) siihen tai puvisilla potilailla (esim. iäkkäät potilaat tai potilaat, joilla on bradykardia, sinussolmukkeen toimintahäiriö tai AV-katkos).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkien henkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Carveration säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaus (PVC/PVdC/Alumiini)

6,25 mg:

Säilytä alle 30 °C:ssa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

12,5 mg ja 25 mg:

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/PVC/Alumiini)

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Carveratio sisältää

- **Vaikuttava aine** on karvediloli.
Yksi tabletti sisältää 6,25/12,5/25 mg karvedilolia.
- **Muut aineet** ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, krospovidoni, povidoni, piidioksiidi (kolloidinen, vedetön), magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot

6,25 mg:n tabletti: valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre sekä merkinnät "C" ja "2". Toinen puoli on sileä.

12,5 mg:n tabletti: valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre sekä merkinnät "C" ja "3". Toinen puoli on sileää.

25 mg:n tabletti: valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre sekä merkinnät "C" ja "4". Toinen puoli on sileää.

Tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 ja 105 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Saksa

Valmistaja

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Saksa

Teva Pharmaceutical Works Ltd.

Pallagi út 13
Debrecen H-4042
Unkari

Lisätietoja tästä valmisteesta antaa myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy
PL 67
02631 Espoo
puh: 020 180 5900

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 26.4.2024.

Bipacksedel: Information till patienten

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg tablett(er)

karvedilol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Carveratio är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Carveratio
3. Hur du tar Carveratio
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Carveratio ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Carveratio är och vad det används för

Carveratio tillhör en grupp läkemedel med både alfa- och betablockerande verkan. Carveratio används för behandling av högt blodtryck och behandling av kärlkramp. Carveratio används även som tilläggsbehandling vid hjärtsvikt.

Karvedilol som finns i Carveratio kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i den här bipackse delen. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Carveratio

Ta inte Carveratio:

- om du är **allergisk** mot karvedilol eller något annat innehållsstämme i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har **obehandlad eller instabil hjärtsvikt** eller vissa typer av **rubbningar i hjärtats retleddningssystem** (så kallad AV-block av typ II och III om du inte har en pacemaker, eller så kallad sjuk sinusknuta).
- om du lider av en **leversjukdom som orsakar problem**.
- om du har en mycket **läg puls** (färre än 50 slag per minut) eller **mycket lågt blodtryck**.
- om du lider av svårt **nedslatt hjärtfunktion** (kardiogenisk chock).
- om du lider av en allvarlig **störning i kroppens syra-basbalans** (metabolisk acidosis, acidemii).
- om du har eller har haft **astma** eller andra **luftvägssjukdomar** med en tendens till täthet i halsen orsakade av kramper (t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom).
- om du lider av allvarliga andningsproblem (akut **lungeemboli**).
- om du lider av en ovanlig form av angina pectoris (**Prinzmetal angina**).
- om du lider av hjärtsvikt efter en luftvägssjukdom (cor pulmonale).
- om du lider av en överfunktion i binjurarna (**feokromocytom**) och detta inte behandlas med medicin.
- om du tar **MAO-hämmare** (t.ex. moklobemid) (förutom MAO-B-hämmare).

- om du får intravenös behandling med **verapamil**, **diltiazem** eller annat läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (antiarytmika).
- om du **ammar**.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carveratio,

- om du har **hjärtsvikt** tillsammans med
 - lågt blodtryck,
 - **brisstfällig blod- och syretillförsel till hjärtat** (ischemisk hjärtsjukdom) och **åderförkalkning** (ateroskleros),
 - och/eller **njurbesvär**.
- Din njurfunktion bör då kontrolleras. Det kan vara nödvändigt att sänka din dos.
- om du har haft en **hjärtattack**. Detta tillstånd måste vara tillräckligt behandlat innan Carveratio tas.
- om du har en viss typ av **rubbning i hjärtats reteledningssystem** (så kallad AV-block typ I).
- om du har högt blodtryck på grund av organiska orsaker.
- om du har **diabetes**. Behandling med Carveratio kan dölja tecken på lågt blodsocker. Ditt blodsocker bör därför kontrolleras regelbundet.
- om du har mycket **dålig blodcirkulation i händer och fötter**.
- samtidig behandling med läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt (digitalisglykosider) eller hjärtrytmrubbningar (t.ex. verapamil, diltiazem).
- lågt blodtryck (ortostatisk hypoton)
 - akut inflammatorisk hjärtsjukdom
 - en åtstramning av hjärtklaffarna eller utflödeskanalen
 - slutstadiet av perifer artärsjukdom
- labil eller sekundär hypertoni
- samtidig behandling med vissa andra blodtryckssänkande läkemedel (alfa1-receptorantagonister eller alfa2-receptoragonister).
- om du har **Raynauds fenomen** (fingrar eller tår blir först blåaktiga, sedan vitaktiga och sedan rödaktiga tillsammans med smärta). Carveratio kan förvärra symtomen.
- om du har **förhöjd sköldkörtelfunktion**, med förhöjd produktion av sköldkörtelhormon. Carveratio kan dölja symtomen.
- om du använder Carveratio och ska genomgå en **operation** och där du ska sövas (anestesi). Du bör diskutera detta med den läkare som ansvarar för anestesin i god tid i förväg.
- om du har en mycket **låg puls (mindre än 55 slag per minut)**.
- om du har haft en svår **allergisk reaktion** (t.ex. mot insektsbett eller viss föda) eller om du genomgår eller ska genomgå en **desensibilisering** eftersom **Carveratio kan minska effekten hos läkemedel som används för att behärla sådana allergiska reaktioner**.
- om du har **psoriasis**.
- allvarliga hudreaktioner (t.ex. toxisk epidermal nekroly [TEN] eller Stevens-Johnsons syndrom [SJS]).
- om du använder **kontaklinser**. Carveratio kan minska produktionen av tårvätska.

Barn och ungdomar

Endast otillräckliga data finns tillgängliga om karvedilols effekt och säkerhet hos barn och ungdomar under 18 år. Carveratio bör därför inte användas till denna patientgrupp.

Äldre

Äldre kan vara mer känsliga för karvedilol och måste övervakas mer noggrant.

Andra läkemedel och Carveratio

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Andra samtidiga läkemedelsbehandlingar kan påverka eller påverkas av Carveratio.

Det är **särskilt viktigt** att din läkare känner till om du redan behandlas med:

- **Digoxin** eller **digitoxin** (för behandling av hjärtsvikt).
- **Insulin** eller **orala diabete släkemedel** (blodsockersänkande medel) eftersom deras blodsockersänkande effekt kan förstärkas och symtom på lågt blodsocker kan döljas.
- **Rifampicin** (antibiotikum som används för behandling av tuberkulos).
- **Karbamazepin** (för behandling av epilepsi).
- **Flukonazol** (läkemedel mot svampinfektioner).
- **Paroxetin, fluoxetin** eller **bupropion** (läkemedel för behandling av depression).
- Läkemedel som innehåller **reserpin, guanetidin, metyldopa, guanfacin** och **monoaminoxidas hämmare** (MAO-hämmare) för behandling av depression och Parkinsons sjukdom, då dessa kan leda till ytterligare sänkning av hjärtfrekvensen.
- **Ciklosporin eller takrolimus** (läkemedel för att hämma immunförsvaret, för att förebygga bortstötningsreaktioner efter organtransplantation). Används även vid vissa reumatiska eller dermatologiska besvär.
- Läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtrytm (t.ex. **verapamil, diltiazem, kinidin, amiodaron**).
- **Klonidin** (läkemedel för att sänka blodtryck).
- **Sympatomimetika** (läkemedel som ökar det sympathiska nervsystemets funktion).
- Läkemedel för behandling av andningsproblem (t.ex. **salbutamol, formoterol**).
- **Dihydropyridiner** (läkemedel för behandling av högt blodtryck samt hjärtsjukdomar).
- **Övriga blodtryckssänkande läkemedel.** Carveratio kan förstärka effekten av andra blodtryckssänkande läkemedel som ges samtidigt (t.ex. **alfa₁-receptorantagonister, nitrater**) och läkemedel för vilka en sänkning i blodtryck inträffar som en biverkning, t.ex. **barbiturate** (vid behandling av epilepsi), **fentiaziner** (för behandling av psykos), tricykliska **antidepressiva medel** (för behandling av depression) samt **vasodilatoriska medel** (läkemedel för att utvidga blodkärl).
- **Neuromuskulära blockerare** (läkemedel som minskar muskelpänning).
- **Ergotamin** (medel vid migrän).
- **Anestetika** (läkemedel som används vid narkos).
- **Vissa värvtabletter** (NSAID-preparat), **östrogener** (hormoner) och **kortikosteroider** (binjurehormon), då dessa i vissa fall kan minska den blodtryckssänkande effekten hos Carveratio.
- **Cinacalcet** (för behandling av sjukdomar i bisköldkörteln).

Carveratio med mat, dryck och alkohol

Att ta Carveratio samtidigt som eller i nära anslutning till grapefrukt eller grapefruktjuice bör undvikas medan behandlingen påbörjas. Grapefrukt och grapefruktjuice kan leda till en ökning av den aktiva substansen karvedilol i blodet och möjigen till oförutsägbara biverkningar.

Att konsumera alkohol under behandling med Carveratio bör begränsas, eftersom alkohol kan påverka hur Carveratio fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det föreligger en risk för fosterskador. Carveratio bör endast användas under graviditet om din läkare anser det nödvändigt. Rådgör därför alltid med din läkare innan du använder Carveratio under graviditet.

Det är inte känt om karvedilol passerar över i bröstmjölk och Carveratio ska därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Yrsel och trötthet kan förekomma i början av behandlingen, efter dosökning, vid byte av produkt eller i kombination med alkohol. Med rätt dos är det inte känt om karvedilol minskar förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner. Om du känner dig yr eller svag då du tar tabletterna bör du undvika bilkörning eller arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Carveratio inne håller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Carveratio

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du känner att effekterna av Carveratio är för starka eller för svaga, tala med läkare eller apotekspersonal.

Du bör svälja tabletterna med minst ett halvt glas vatten. Du kan ta tabletterna med eller utan mat. Patienter med hjärtsvikt bör däremot ta tabletterna tillsammans med mat för att minska risken för yrsel när man reser sig hastigt tillstående.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Carveratio tabletter finns tillgängliga i följande styrkor:
6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg

Högt blodtryck:

Vuxna:

Vanlig dos är 1 tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) under de första två dagarna och 2 tablettar Carveratio 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) en gång dagligen därefter. Andra styrkor på karvedilol finns tillgängliga för denna dosering.

Vid behov kan dosen ökas gradvis, med ett intervall på minst två veckor. Rekommenderad maximal daglig dos är 50 mg.

Äldre patienter:

Rekommenderad dos är en tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) en gång dagligen.

Vid behov kan dosen ökas gradvis med minst två veckors intervaller till den maximala dagliga dosen 50 mg.

Kärlkramp:

Vuxna:

Vanlig dos är 1 tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) två gånger dagligen i två dagar och 2 tablettar Carveratio 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) två gånger dagligen därefter. Andra styrkor på Carveratio finns tillgängliga för denna dosering.

Vid behov kan dosen ökas gradvis, med ett intervall på minst två veckor. Rekommenderad maximal daglig dos är 100 mg.

Äldre patienter:

Vanlig dos är en tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) två gånger dagligen under två dagar och därefter två tablettar Carveratio 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) två gånger dagligen. Rekommenderad maximal daglig dos är 50 mg.

Hjärtsvikt:

Vanlig startdos är 3,125 mg karvedilol två gånger dagligen i två veckor. Dosen kan ökas stegvis, vanligtvis med två veckors intervall.

Dosen kan emellertid behöva ökas eller sänkas. Din läkare kommer då att informera dig om detta.

Den rekommenderade maximala dagliga dosen är 25 mg två gånger dagligen till patienter som väger mindre än 85 kg och 50 mg två gånger dagligen till patienter som väger mer än 85 kg, förutsatt att hjärtsvikten inte är svår. Om dosen ökas till 50 mg två gånger dagligen ska försiktighet iakttas och tillståndet ska följas noga av läkaren.

Om du har tagit för stor mängd av Carveratio

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdos kan inkludera svimningskänsla på grund av ytterst lågt blodtryck, låg hjärtfrekvens och i allvarliga fall tillfälligt uteblivna hjärtslag. Andningssvårigheter, sammandragna luftvägar, lätt illamående, sänkt medvetande och krampanfall kan förekomma.

Om du har glömt att ta Carveratio

Om du har glömt att ta en dos (eller flera doser), ta nästa dos vid samma tid som vanligt. Ta inte dubbel (eller större) dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Carveratio

Avbryt inte behandlingen plötsligt och ändra inte dosen om inte läkaren har ordinerat detta. Behandlingen ska avslutas gradvis under två veckors tid. Plötsligt avslutande kan förvärra symptomen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Majoriteten av biverkningarna är dosberoende och försvinner när dosen sänks eller behandlingen avbryts. Vissa biverkningar kan inträffa i början av behandlingen och försvinner av sig själva då behandlingen fortsätter.

Kontakta läkaren omedelbart om du får någon av följande biverkningar

- Bröstsmärtor med samtidig andnöd, svettning och illamående (kan drabba upp till 1 av 100 personer).
- Allvarliga hudreaktioner, såsom utslag, rodnad, blåsor på läpparna, runt ögonen eller i munnen, fjällande hud (symtom på erythema multiforme), sår i munnen, läpparna och huden (tecken på Stevens-Johnsons syndrom), avskalning av det översta hudlagret från de nedre hudlagren i hela kroppen (tecken på giftig epidermal nekrolysis) (frekvens mycket sällsynt).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- yrsel
- huvudvärk
- hjärtsvikt
- lågt blodtryck
- svaghet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- luftrörskatarr (bronkit), lunginflammation, övre luftvägsinfektion

- urinvägsinfektion
- lågt antal röda blodkroppar
- viktökning
- förhöjda kolesterolvärdet
- försämrad blodsockerbalans hos diabetiker
- depression, nedstämdhet
- synstörningar
- minskad produktion av tårvätska, ögonirritation
- låg hjärtfrekvens
- ödem (svullnad i kroppen eller delar av kroppen), vätskeöverskott, ökad blodvolym i kroppen
- yrsel när man reser sig upp hastigt
- simning
- problem med blodcirkulationen (symtomen är bl.a. kalla händer och fötter), åderförkalkning (ateroskleros), förvärrade symtom på Raynauds syndrom (fingrar och tår blir först blåaktiga, sedan vitaktiga och därefter rödaktiga tillsammans med smärta) eller fönstertittarsjuka (smärta i benen som förvärras när man går)
- astma och andningssvårigheter
- vätskeansamling i lungorna
- diarré
- sjukdomskänsla, illamående, kräkningar, magsmärta, matsmältningsbesvär
- smärta (t.ex. i armar och ben)
- akut njursvikt och störningar i njurfunktionen hos patienter med åderförkalkning och/eller nedsatt njurfunktion
- urineringssvårigheter

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- sömnstörning
- förvirring, hallucinationer
- mardrömmar
- onormal känsla i kroppen
- störningar i hjärtats ledningssystem, angina pectoris (inklusive bröstmärta)
- vissa hudreaktioner (t.ex. allergisk dermatit, nässelutslag, klåda och hudinflammation, ökad svettning, hudförändringar som liknar psoriasis eller lichen planus)
- förstoppling
- impotens

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
- täppt näsa
- muntorrhet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare, inklusive enstaka fall):

- minskat antal vita blodkroppar
- psykos
- allergiska reaktioner
- förändringar i leverfunktionsvärdet
- ofrivilligt urinläckage (urininkontinens) hos kvinnor.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- hårvälfall

Läkemedelsklassen beta-receptorblockerare kan utlösa dold diabetes.

Sinusarrest (utebliven impuls från sinusknutan, hjärtats "pacemaker" som kontrollerar hjärtats sammandragningar och reglerar hjärtrytmen) hos patienter som har anlag för detta (t.ex. äldre patienter eller patienter som sedan tidigare har långsam hjärtrytm (bradykardi), försämrad funktion hos sinusknutan (sinusknutedysfunktion) eller rytmrubbnings (AV-block)).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 Fimea

5. Hur Carveratio ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistret efter EXP.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blister (PVC/PVdC-Aluminium)

6,25 mg:

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

12,5 mg och 25 mg:

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Blister (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium)

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karvedilol.
Varje tablett innehåller 6,25/12,5/25 mg karvedilol.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, krospovidon, povidon, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

6,25 mg tablett: vita, bikonvexa, kapselformade tablett med brytskåra, präglade med "C" och "2" på den ena sidan och släta på den andra sidan.

12,5 mg tablett: vita, bikonvexa, kapselformade tablett med brytskåra, präglade med "C" och "3" på den ena sidan och släta på den andra sidan.

25 mg tablett: vita, bikonvexa, kapselformade tablett med brytskåra, präglade med "C" och "4" på den ena sidan och släta på den andra sidan.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 105 tablett.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Tyskland

Tillverkare:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Tyskland

Teva Pharmaceutical Works Ltd.

Pallagi út 13
Debrecen H-4042
Ungern

Ytterligare upplysningar om detta läke medel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Teva Finland Oy
PB 67
02631 Esbo
Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast 26.4.2024.