

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

PAMOL® F 125 mg, dispergoituva tabletti

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi dispergoituva tabletti sisältää 125 mg parasetamolia (päälystettyinä parasetamolikiteinä).

Apuaineet: yksi tabletti sisältää myös 15 mg aspartaamia (E951).

Täydellinen apuaineluetelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Dispergoituva tabletti.

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, banaanintuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukainen hoito.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Tämä lääkemuoto on tarkoitettu 7–25 kg painaville lapsille (ikä noin 6 kuukautta–10 vuotta).

Kun lääkettä annetaan lapsille, on ehdottoman tärkeää noudattaa **painoon perustuvaa annostusta** ja käyttää oikeaa lääkemuota. Painoon perustuvat ikäarviot on annettu lisähjeeksi.

Suositeltu parasetamolin vuorokausiannos on noin 60 mg/kg jaettuna 4 tai 6 antokertaan vuorokaudessa eli noin 15 mg/kg joka kuudes tunti tai 10 mg/kg joka neljäs tunti.

- **7–10 kg** painavien lasten (ikä noin 6–8 kuukautta) annos on 1 tabletti kerrallaan. Annoksen voi tarvittaessa toistaa kuuden tunnin kuluttua, mutta **vuorokauden kokonaisannos ei saa ylittää 4:ää tablettia**.
- **11–12 kg** painavien lasten (ikä noin 1½–2 vuotta) annos on 1 tabletti kerrallaan. Annoksen voi tarvittaessa toistaa neljän tunnin kuluttua, mutta **vuorokauden kokonaisannos ei saa ylittää 6:ta tablettia**.
- **13–20 kg** painavien lasten (ikä noin 2–7 vuotta) annos on 2 tablettia kerrallaan. Annoksen voi tarvittaessa toistaa kuuden tunnin kuluttua, mutta **vuorokauden kokonaisannos ei saa ylittää 8:aa tablettia**.
- **21–25 kg** painavien lasten (ikä noin 6–10 vuotta) annos on 2 tablettia kerrallaan. Annoksen voi tarvittaessa toistaa neljän tunnin kuluttua, mutta **vuorokauden kokonaisannos ei saa ylittää 12:ta tablettia**.

Suurin vuorokausiannos:

Parasetamolin kokonaisannos vuorokaudessa saa olla korkeintaan 80 mg/kg alle 37 kg painavilla lapsilla ja korkeintaan 3 g 38 kg tai enemmän painavilla lapsilla (ks. kohta 4.9 "Yliannostus").

Antotihelys

Lääkettä tulisi antaa lapsille säännöllisesti **myös yöäikaan, mieluiten 6 tunnin välein**. Kahden annoksen välisen ajan tulee olla vähintään 4 tuntia.

Erityisryhmät:

Maksan vajaatoiminta

Jos potilaan maksan toiminta on heikentynyt tai hänenlä on Gilbertin oireyhtymä, annosta on pienennettävä tai annosvälä pidennettävä.

Vuorokausiannos ei saa ylittää 2 grammia ilman erityistä lääkärin määräystä.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla annosta on pienennettävä ja kahden annoksen ottamisen välisen ajan tulee kasvaa seuraavan taulukon mukaan:

Glomerulosten suodatusnopeus	Annos
≥ 50 ml/min	4 tunnin välein
10-50 ml/min	6 tunnin välein
< 10 ml/min	8 tunnin välein

Seuraavissa tapauksissa vuorokausiannos ei saa ylittää 60 mg/kg/vrk (enintään 2 g/vrk), mikäli lääkäri ei toisin määrää (ks. kohta 4.4):

- aikuisen potilaan paino < 50 kg
- krooninen alkoholismi
- elimistön kuivumistila
- krooninen aliravitsemus.

Antotapa

Suun kautta.

Kun lääkettä annetaan alle kuusivuotiaille lapsille, tabletit on syytä liuottaa lusikalliseen vettä tai maitoa ennen antamista (hedelmämehun kanssa maku voi olla kitkerä).

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit – ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Fenyylketonuria (valmiste sisältää aspartaamia).

Vaikea maksan vajaatoiminta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Älä ylitä mainittua annosta.

Pitkään jatkuva tämän lääkkeen käyttö muuten kuin lääkärin valvonnassa saattaa olla haitallista. Tätä lääkettä tulisi käyttää vain siinä tapauksessa, että käyttö on selvästi tarpeen.

Suositeltua suurempien annosten ottaminen aiheuttaa hyvin vakavan maksavaurion vaaran. Vastalääkehoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti. Katso kohta 4.9.

Yliannostusriskin välttämiseksi potilaille tulee muistuttaa, että muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Alle 37 kiloa painavien lasten parasetamoliannos ei saa ylittää 80 mg:aa kiloa kohti vuorokaudessa ja 38 kg tai enemmän painavien lasten parasetamoliannos ei saa ylittää 3 g:aa vuorokaudessa (katso 4.9 "Yliannostus").

Tablettien antamista kokonaисina alle kuusivuotiaille lapsille ei suositella, koska lapsi saattaa vetää tabletin henkeensä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 15 mg aspartaamia per annosyksikkö. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilölle, joilla on fenyylketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi. Nonkliinistä tai klinistä tietoa aspartaaminin käytöstä alle 12 viikon ikäisille vauvoille ei ole saatavana arvointia varten.

Käytöön liittyvät varotoimet

Maksatoksisuus

Parasetamoliin liittyvä maksatoksisuutta on havaittu potilailla, joilla on (yksi tai useampi) riskitekijä. Parasetamolia tulee käyttää varoen potilailla, joilla on riskitekijöitä ja erityisesti:

- alle 50 kg:n paino aikuisilla (ks. kohta 4.2)
- lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.2) (parasetamolin käyttö on vasta-aiheista vaikean maksan vajaatoiminnan yhteydessä)
- munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.2)
- Gilbertin oireyhtymä (familialinen ei-hemolyttinen keltaisuus) (ks. kohta 4.2)
- alkoholismi (ks. kohta 4.2)
- krooninen aliravitsemus (vähäiset maksan glutationin varastot) (ks. kohta 4.2)
- elimistön kuivuminen (ks. kohta 4.2)
- maksatoksisten lääkkeiden samanaikainen käyttö.

Parasetamoliannoksia tulee tarkistaa klinisesti sopivin väliajoin ja potilaita tulee tarkkailla uusien maksatoksisuuden riskitekijöiden ilmaantumisen varalta, mikä saattaa edellyttää annoksen muuttamista. Jos akuutti virushepatiitti diagnosoidaan, hoito tulee lopettaa.

Kun lapselle annetaan 60 mg/kg parasetamolia vuorokaudessa, ei hoitoon ole tarpeen liittää muuta kuumelääkettä, paitsi jos hoito ei tehoa.

Jos kuume on korkea, potilaalla on merkkejä sekundaari-infektiosta tai oireet jatkuvat yli kolme vuorokautta, hoito on syytä arvioida uudelleen.

Parasetamolin ja flukloksasilliinin samanaikaisessa annossa on noudatettava varovaisuutta, koska suurentuneen anionivajeen aiheuttaman metabolisen asidoosin (HAGMAn) riski on suurentunut etenkin potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis, aliravitsemus tai muu glutationivajeen syy (esim. krooninen alkoholismi), samoin kuin käytettäessä parasetamolista enimmäisannoksia päivittäin. Tarkkaa seurantaa, mukaan lukien virtsan 5-oksoproliinin mittauamista, suositellaan.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

- Probenesidi vähentää lähes kaksinkertaisesti parasetamolin puhdistumaa estämällä sen

konjugaation glukuronidihapon avulla. Kun parasetamolia käytetään samanaikaisesti probenesidin kanssa, sen annoksen pienentämistä tulisi harkita.

- Salisyliamidi saattaa pidentää parasetamolin eliminaation puoliintumisaikaa.
- Parasetamolia tulee käyttää varoen samanaikaisesti entsyymejä indusoivien aineiden (esim. karbamatepiini, fenobarbitoni, fentyöni, primidoni, rifampisiini, mäkikuisma) tai mahdollisesti maksatoksisten aineiden kanssa (katso kohta 4.9).
- Metoklopramidi ja domperidoni nopeuttavat parasetamolin imetyymistä.
- Kolestyramiini hidastaa parasetamolin imetyymistä.
- Samanaikainen parasetamolin (4 g vuorokaudessa vähintään 4 vuorokauden ajan) ja suun kautta otettavien antikoagulantien käyttö saattaa aiheuttaa vähäisiä muutoksia INR-arvoissa ja suurentaa verenvuodon riskiä. INR-arvoja tulee seurata tavallista useammin yhteiskäytön aikana ja sen lopettamisen jälkeen.
- On syytä varovaisuuteen, kun parasetamolia käytetään samanaikaisesti flukloksasilliinin kanssa, sillä samanaikaiseen käyttöön on liittynyt suurentuneesta anionivajeesta johtuvaa metabolista asidoosia etenkin niillä potilailla, joilla on riskitekijöitä. (Ks. kohta 4.4.).

Yhteisvaikutus laboratoriotutkimusten kanssa

Parasetamolin käyttö voi vaikuttaa virtsahappomäärityskseen tutkimuksissa, jotka on tehty fosfovolfraumiappomenetelmällä, sekä verensokerimäärityskseen, jotka on tehty glukoosioksidaasi-peroksidaasi-menetelmällä.

4.6 Hedelmällisyys raskaus ja imetyks

Raskaus

Raskaana olevista naisista saatu suuri määrä tietoa ei viittaa epämuodostumien aiheutumiseen eikä toksisuuteen sikiölle/vastasyntyneelle. Epidemiologiset tutkimukset parasetamolle kohdussa altistuneiden lasten neurologisesta kehityksestä eivät ole antaneet ratkaisevia tuloksia. Kliinisesti tarvittaessa parasetamolia voidaan käyttää raskauden aikana; sitä olisi kuitenkin käytettävä pienimmällä vaikuttavalla annoksella ja lyhimmän mahdollisen ajan sekä mahdollisimman harvoin.

Imetyks

Pieniä määriä suun kautta otetusta parasetamolista erittyy äidinmaitoon. Haitallisia vaikuttuksia imettäviin lapsiin ei ole raportoitu. Tätä lääkevalmistetta voidaan käyttää terapeutisina annoksina imetyksen aikana.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen

4.8 Haittavaikutukset

Elinluokka	Harvinaiset ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$)	Hyvin harvinaiset ($< 1/10\ 000$)	Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Maksa ja sappi	maksan transaminaasien lisääntyminen		maksaaentsyymiарвоjen pieneminen tai suureneminen (erityisesti potilailla, joilla on riskitekijöitä) (ks. kohta 4.4)
Immuunijärjestelmä		yliherkkysreaktiot (vaihtelevat yksinkertaisesta	

		ihoreaktioista tai urtikariasta anafylaktiseen sokkiin, joka vaatii hoidon keskeyttämisen)	
Veri ja imukudos			trombopenia, leukopenia, neutropenia (yksittäisiä tapauksia)
Iho ja ihonalainen kudos		Vakavia ihoreaktioita on raportoitu hyvin harvoin.	

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Yliannostukseen liittyy maksavaurion vaara (mukaan lukien fulminantti maksatulehdus, maksan vajaatoiminta, kolestaattinen maksatulehdus, sytolyyttinen maksatulehdus), erityisesti vanhuksilla, pienillä lapsilla, maksasairauspotilailla, kroonista alkoholismia sairastavilla, kroonista aliravitsemusta sairastavilla ja entsyymi-induktoreja saavilla potilailla. Näissä tapauksissa yliannostus saattaa olla hengenvaarallinen.

Oireet ilmenevät yleensä ensimmäisen 24 tunnin aikana ja niitä ovat pahoinvoindi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakipu.

Yliannostus (7,5 g tai enemmän parasetamolia yhtenä annoksena aikuiselle tai 140 mg/kg yhtenä annoksena lapselle) aiheuttaa maksasolujen nekroosin. Tämä johtaa todennäköisesti täydelliseen ja palautumattomaan nekroosiin ja aiheuttaa maksan vajaatoimintaa, metabolista asidoosia ja encefalopatiaa, jotka voivat aiheuttaa kooman ja johtaa kuolemaan.

Samanaikaisesti havaitaan maksan transaminaasien (AST, ALT), laktaattidehydrogenaasin ja bilirubiinin lisääntymistä sekä protrombiiniajan pitenemistä. Vaikutukset saattavat ilmetä 12–48 tuntia parasetamolin ottamisen jälkeen. Ensimmäiset maksavaurion kliiniset oireet havaitaan yleensä kahden vuorokauden kuluttua ja ne ovat pahimmillaan 4–6 vuorokauden kuluttua.

Akuutti munuaisten vajaatoiminta, johon liittyy akuutti munuaistiehyiden nekroosi, saattaa kehittyä, vaikka henkilöllä ei olisikaan vaikeaa maksavauriota. Muita raportoituja parasetamolin yliannostukseen aiheuttamia, maksaan liittymättömiä oireita ovat sydänlihakseen liittyvät poikkeavuudet ja haimatulehdus.

Hätätilanteissa menetellään seuraavasti:

- Siirretään potilaas välittömästi sairaalaan, vaikka hänen lääkettä ei olisikaan merkittäviä ensioireita.
- Otetaan verikoe plasman parasetamolipitoisuuden lähtöarvon määrittämiseksi.
- Tehdään mahahuuhTELU.
- Annetaan laskimoon (tai suun kautta, jos mahdollista) vastalääkettä, N-asetyylilyksteiiniä, jos mahdollista *ennen kuin* 10 tuntia on kulunut parasetamolin ottamisesta. N-asetyylilyksteiini saattaa kuitenkin auttaa jonkin verran myös sen jälkeen, kun 10 tuntia on kulunut aina 48 tuntiin asti yliannostukseen ottamisesta, mutta tällaisissa tapauksissa hoitoa annetaan kauemmin.

- Potilasta hoidetaan oireenmukaisesti.
- Suun kautta annettavaa metioniiniä voidaan käyttää N-asetyylkysteïinin sijasta siinä tapauksessa, että se annetaan mahdollisimman nopeasti yliannostuksen jälkeen ja joka tapauksessa 10 tunnin kuluessa yliannostuksesta.

5. FARMAKOLOGISET OMNAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: kipulääkkeet ja kuumelääkkeet, anilidit
ATC-koodi: N02BE01

Parasetamolin kipua lievittävien ja kuumetta alentavien ominaisuuksien täsmällinen mekanismi on vielä epäselvä, siihen saattaa liittyä sekä sentraalisia että perifeerisiä vaikuttuksia.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otetun parasetamolin imetyminen on nopeaa ja täydellistä. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 30–60 minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta.

Jakaantuminen

Parasetamoli jakautuu nopeasti kaikkiin kudoksiin. Pitoisuudet ovat samanlaisia veressä, syljessä ja plasmassa. Sitoutuminen proteiinille on vähäistä.

Aineenvaihdunta

Parasetamoli metaboloituu pääasiassa maksassa. Tärkeimmät aineenvaihduntareitit ovat konjugoituminen glukuronideiksi ja sulfaateiksi. Jälkimmäinen reitti saturoituu nopeasti käytettäessä terapeuttista annosta suurempia annoksia. Pienempi osa metaboloituu sytokromi P450:n (pääasiassa CYP2E1) katalysoimana, jolloin muodostuu reaktiivinen välituotemetaboliitti (N-asetylbentsokinoni-imini). Tavallisesti se detoksifioituu nopeasti glutationin vaikutuksesta ja eliminoituu virtsaan kysteïin- ja merkaptuurihappokonjugaatteina. Vaikeassa myrkytyksessä tämän toksisen metaboliitin määrä lisääntyy.

Eliminaatio

Eliminaatio tapahtuu pääosin virtsan kautta. 90 % otetusta annoksesta eliminoituu munuaisten kautta 24 tunnin kuluessa, pääosin glukuronidi- (60–80 %) ja sulfaattikonjugaatteina (20–30 %). Alle 5 % eliminoituu muuttumattomana.

Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia.

Fysiopatologiset variaatiot

Munuaisten vajaatoiminta. Vaikaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (kreatiniinipuhdistuma alle 10 ml/min) parasetamolin ja sen metaboliittien eliminaatio hidastuu.

Vanhukset. Konjugaatiokyky ei muutu iän myötä.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kun parasetamolin akuuttia, subkroonista ja kroonista toksisuutta tutkittiin eläinkokeissa rotilla ja hiirillä, havaittiin maha-suolikanavan vaurioita, verenkuvan muutoksia, maksan ja munuaisten peruskudoksen vauriotumista ja jopa nekrooseja. Näiden muutosten syynä pidetään yhtäältä parasetamolin vaikutustapaa ja toisaalta parasetamolin metabolismia. Metaboliitteja, joiden oletetaan aiheuttavan toksisia vaikuttuksia ja niihin liittyviä elinmuutoksia, on löydetty myös ihmistä. Pitkään (vuoden) jatkuvan käytön aikana on hyvin harvoissa tapauksissa lisäksi havaittu korjautuvaa kroonista

aggressiivista hepatiittia käytettäessä suurimpia terapeuttisia annoksia. Myrkytyksen oireet voivat ilmaantua 3 viikon jälkeen kun käytetään subtoksisia annoksia. Tämän vuoksi parasetamolia ei tulisi käyttää pitkään eikä suurina annoksina.

Laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että parasetamoli ei aiheuta olennaista genotoksista riskiä, kun käytetään terapeuttisia eli ei-toksisia annoksia.

Pitkääikaiset rott- ja hiiritutkimukset eivät ole osoittaneet, että parasetamolilla olisi olennaisia kasvaimia aiheuttavia vaiktuksia käytettäessä ei-maksatoksisia annoksia.

Parasetamoli läpäisee istukan.

Eläinkokeista ja tähänastisista käyttökokemuksista ihmislle ei ole saatu viitteitä siitä, että parasetamolilla olisi toksisia vaiktuksia lisääntymiseen.

Tavanomaisia tutkimuksia, joissa on käytetty nykyisin hyväksyttyjä standardeja lisääntymis- ja kehitystoksisuuden arviointiin, ei ole saatavissa.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Parasetamolikiteiden päälyste:

Emäksinen butyloitu metakrylaattikopolymeeri

30-prosenttinen polyakrylaattidispersio

Piidioksidi, hydrofobinen, kolloidinen

Tabletin perusaine:

Mannitoli (rakeistettu, jauhe)

Krospovidoni

Aspartaami (E951)

Banaaniaromi

Magnesiumstearaatti

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Repäisemällä avattava, lapsiturvallinen läpipainopakkaus: polyamidi-/PVC-/alumiiniläpäipa inopakkaus, alumiini-/PET-kalvo

Pakkauskoot: 12 tai 24 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisohjeita.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
DK-5260 Odense S
Tanska

8. MYYNTILUVAN NUMERO

17001

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 22.1.2003
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 22.5.2008

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

19.09.2022

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

PAMOL® F 125 mg dispergerbar tablett

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dispergerbar tablett innehåller 125 mg paracetamol (i form av överdragna paracetamolkristaller). Hjälpämnen: varje tablett innehåller också 15 mg aspartam (E951).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Dispergerbar tablett.

Vit, rund, bikonvex, banandoftande tablett med konkav mittskåra.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Symptomatisk behandling av mild till måttlig smärta och feber.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Läkemedlet är avsett för barn som väger 7–25 kg (ungefär 6 månader–10 år).

Om läkemedlet ges till barn, är det viktigt att följa **en viktbaserad dosering** och att använda rätt läkemedelsform. Åldersbedömningsarna grundade på vikt ges som ytterligare vägledning.

Rekommenderad dygnsdos av paracetamol är ungefär 60 mg/kg fördelat på 4 eller 6 doser per dygn, alltså ungefär 15 mg/kg var 6:e timme eller 10 mg/kg var 4:e timme.

- **7–10 kg** vikt (barnets ålder ungefär 6–8 månader) ges en dos om 1 tablett åt gången. Vid behov kan dosen upprepas efter sex timmar, men **den totala dygnsdosen får inte överstiga 4 tablettter**.
- **11–12 kg** vikt (barnets ålder ungefär 1½–2 år) ges en dos om 1 tablett åt gången. Vid behov kan dosen upprepas efter fyra timmar, men **den totala dygnsdosen får inte överstiga 6 tablettter**.
- **13–20 kg** vikt (ålder ungefär 2–7 år) ges en dos om 2 tablettter åt gången. Vid behov kan dosen upprepas efter sex timmar, men **den totala dygnsdosen får inte överstiga 8 tablettter**.
- **21–25 kg** vikt (barnets ålder ungefär 6–10 år) ges en dos om 2 tablett åt gången. Vid behov kan dosen upprepas efter fyra timmar, men **den totala dygnsdosen får inte överstiga 12 tablettter**.

Högsta dygnsdos: Den totala dygnsdosen paracetamol får inte överstiga 80 mg/kg hos barn som väger mindre än 37 kg och inte överstiga 3 g hos barn som väger 38 kg eller mer (se avsnitt 4.9)

Överdosering).

Administreringsfrekvens

Läkemedlet bör ges regelbundet **även nattetid**, helst med 6 timmars mellanrum. Intervallet mellan två doser ska vara minst 4 timmar.

Särskilda patientgrupper:

Leverinsufficiens

Om patienten har en nedsatt leverfunktion eller lider av Gilberts syndrom ska dosen minskas eller dosintervallet förlängas.

Dygnsdosen får inte överskrida 2 g utan särskild läkarordination.

Njurinsufficiens

Hos patienter som lider av njurinsufficiens ska dosen minskas och tiden mellan två doser ökas enligt följande tabell:

Glomerulär filtreringshastighet	Dos
≥ 50 ml/min	Var 4:e timme
10–50 ml/min	Var 6:e timme
< 10 ml/min	Var 8:e timme

I följande fall får dygnsdosen inte överskrida 60 mg/kg per dygn (upp till 2 g/dygn) om inte annat föreskrivs av läkaren (se avsnitt 4.4):

- vikten hos en vuxen patient < 50 kg
- kronisk alkoholism
- uttorkning av kroppen
- kronisk undernäring.

Administreringssätt

För oral användning.

Om tabletterna ges till barn under sex år, ska de lösas i en sked vatten eller mjölk före administrering (tillsammans med fruktjuice kan smaken vara bitter).

Barn över sex år kan suga på tabletterna – de bryts ner mycket snabbt i munnen när de kommer i kontakt med saliv.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpmämne som anges i avsnitt 6.1.

Fenylketonuri (innehåller aspartam).

Kraftigt nedsatt leverfunktion.

4.4 Varningar och försiktighet

Varningar

Överskrid inte den angivna dosen.

Långvarig användning av detta läkemedel utan läkares tillsyn kan vara skadligt.

Detta läkemedel ska endast användas om det är absolut nödvändigt.

Det finns en mycket stor risk för leverskador om patienten tar mer än den rekommenderade dosen. Behandling med antidot bör inledas så snart som möjligt. Se punkt 4.9. För att undvika risken för överdosering bör patienterna påminnas om att inte ta andra paracetamolhaltiga produkter samtidigt.

Dosen paracetamol till barn som väger mindre än 37 kg får inte överskrida 80 mg/kg per dygn och dosen paracetamol till barn som väger 38 kg eller mer får inte överskrida 3 g per dygn (se 4.9 "Överdosering").

Det rekommenderas inte att tabletterna ges hela till barn under sex år, eftersom barnet kan dra in tabletten i luftstrupen.

Detta läkemedel innehåller 15 mg aspartam per dosenhett. Aspartam är en källa till fenyylalanin. Det kan vara skadligt för personer med fenyylketonuri (PKU), som är en sällsynt ärftlig sjukdom, där fenyylalanin ackumuleras i kroppen, eftersom kroppen inte kan eliminera det tillräckligt. Det finns inga icke-kliniska eller kliniska data tillgängliga om användning av aspartam hos spädbarn under 12 veckors ålder för utvärdering.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Levertoxicitet

Levertoxicitet har i samband med paracetamol observerats hos patienter med (en eller flera) riskfaktorer.

Paracetamol ska användas med försiktighet hos patienter som har riskfaktorer och i synnerhet hos:

- vuxna som väger mindre än 50 kg (se avsnitt 4.2)
- personer med lindrigt eller måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2) (användning av paracetamol är kontraindicerat vid grav leverinsufficiens)
- njurinsufficiens (se avsnitt 4.2)
- Gilberts syndrom (familjär icke-hemolytisk gulsot) (se avsnitt 4.2)
- alkoholism (se avsnitt 4.2)
- kronisk undernäring (låga glutationsreserver i levern) (se avsnitt 4.2)
- uttorkning av kroppen (se avsnitt 4.2)
- samtidigt intag av levertoxiska läkemedel.

Paracetamoldoserna ska ses över med kliniskt adekvata intervaller och patienterna ska övervakas för eventuell uppkomst av nya riskfaktorer för levertoxicitet, vilka kan kräva justering av dosen. Om akut virushepatit diagnostiseras, ska behandlingen avbrytas.

Om ett barn får 60 mg/kg paracetamol per dygn behövs ingen ytterligare febernedslättande behandling, utom när behandlingen inte är effektiv.

Om febern är hög, patienten visar tecken på en sekundär infektion, eller symtomen kvarstår i mer än 3 dygn, bör behandlingen utvärderas på nytt.

Försiktighet rekommenderas när paracetamol administreras tillsammans med flukloxacillin på grund av den ökade risken för HAGMA (high anion gap metabolic acidosis), i synnerhet till patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis, malnutrition och andra orsaker till glutationbrist (t.ex. kronisk alkoholism), samt särskilt vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol. Noggrann övervakning, inklusive sökning efter 5-oxoprolin i urinen rekommenderas.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

- Probenecid nästan fördubblar clearance av paracetamol genom att hämma dess konjugering med glukuronsyra. Om paracetamol administreras samtidigt med probenecid bör en minskning av dosen övervägas.
- Salicylamid kan förlänga halveringstiden för eliminering av paracetamol.

- Paracetamol ska användas med försiktighet i kombination med enzyminducerare (till exempel karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon, rifampicin, johannesört) eller potentellt hepatotoxiska medel (se avsnitt 4.9).
- Metoklopramid och domperidon ökar absorptionshastigheten hos paracetamol.
- Kolestyramin fördröjer absorptionen av paracetamol.
- Samtidig användning av paracetamol (4 g dagligen under minst 4 dygn) och orala antikoagulantia kan leda till mindre förändringar av INR-värdena och öka risken för blödningar. INR-värdena bör övervakas oftare under samtidig administrering och efter utsättning av den.
- Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av paracetamol och flukloxacillin eftersom samtidigt intag har förknippats med HAGMA (high anion gap metabolic acidosis), särskilt hos patienter med riskfaktorer. (se avsnitt 4.4.).

Interaktioner med laboratorieprover

Användning av paracetamol kan störa urinsyratester i undersökningar med fosvolframsyrametoden och blodsockerprover med glukosoxidas-peroxidasmetoden.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En stor mängd data från gravida kvinnor indikerar varken missbildningar, fostertoxicitet eller neonatal toxicitet. Epidemiologiska studier av neurologisk utveckling hos barn som exponerats för paracetamol in utero visar inte konkusiva resultat. Paracetamol kan användas under graviditet om det krävs kliniskt, men med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid och med lägsta möjliga frekvens.

Amning

Små mängder oralt paracetamol utsöndras i bröstmjölk. Inga biverkningar på ammande barn har rapporterats. Läkemedlet kan användas i terapeutiska doser under amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Organsystem	Sällsynta ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$)	Mycket sällsynta ($< 1/10\ 000$)	Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
Lever och gallvägar	förhöjda levertransaminaser		Minskning eller ökning av leverenzymen (särskilt hos patienter med riskfaktorer) (se avsnitt 4.4)
Immunsystemet		överkänslighetsreaktioner (varierar från enkla hudreaktioner eller urticaria till anafylaktisk chock, då behandlingen måste avbrytas)	
Blodet och lymfsystemet			trombocytopeni, leukopeni, neutropeni (enstaka fall)
Hud och subkutan vävnad		Allvarliga hudreaktioner har mycket sällan	

		rapporterats.	
--	--	---------------	--

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nyttå-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

Överdosering medför risk för leverskador (inklusive fulminant hepatit, leversvikt, kolestatisk hepatit, cytolytisk hepatit), särskilt hos äldre, spädbarn, patienter med leversjukdom, patienter med kronisk alkoholism, patienter med kronisk undernäring och patienter som får enzyminducerare. I dessa fall kan överdosering vara livshotande.

Symtomen visar sig vanligen inom de första 24 timmarna och kan till exempel vara illamående, kräkningar, bristande appetit, blekhet och buksmärta.

Överdosering (7,5 g eller mer paracetamol i en engångsdos till en vuxen eller 140 mg/kg i en engångsdos till ett barn) leder till nekros av leverceller. Detta leder sannolikt till fullständig och irreversibel nekros, leversvikt, metabolisk acidosis och encefalopati, vilket kan leda till koma och död. Ökningar av levertransaminaser (ASAT, ALAT), laktatdehydrogenas, bilirubin och förlängd protrombintid observeras samtidigt. Effekterna kan visa sig 12–48 timmar efter intag av paracetamol. De första kliniska tecknen på leverskada visar sig vanligtvis efter två dygn och är som allvarligast efter 4–6 dygn.

Akut njursvikt med akut tubulär nekros kan utvecklas även om patienten inte har en allvarlig leverskada. Andra rapporterade symtom på överdosering orsakade av paracetamol som inte hör ihop med levern, är avvikelser i hjärtmuskeln och pankreatit.

Vid en nödsituation, gör så här:

- Se till att patienten omedelbart kommer in på sjukhus, även om det inte finns några signifikanta första symtom.
- Ta blodprov för att bestämma startnivåerna av paracetamol i plasman.
- Utför magsköljning.
- Administrera N-acetylcystein som antidot intravenöst (eller oralt om möjligt), helst *inom* 10 timmar efter intaget av paracetamol. N-acetylcystein kan dock fortfarande vara till viss hjälp efter 10–48 timmar efter överdosering, men i sådana fall ska behandlingen ges under längre tid.
- Behandla patienten symptomatiskt.
- Metionin som administreras oralt kan användas i stället för N-acetylcystein om det ges så snart som möjligt efter en överdos, och åtminstone inom 10 timmar efter överdoseringen.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: smärtstillande och febernedrättande medel, anilider
ATC-kod: N02BE01

Den exakta mekanismen för de smärtstillande och febernedrättande egenskaperna hos paracetamol är

fortfarande oklar, och kan vara förknippad med både centrala och perifera effekter.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Oralt administrerad paracetamol absorberas snabbt och fullständigt. Maximal halt i plasma uppnås inom 30–60 minuter efter dosering.

Distribution

Paracetamol distribueras snabbt till alla vävnader. Halterna i blod, saliv och plasma är jämförbara. Proteinbindningen är låg.

Metabolism

Paracetamol metaboliseras primärt i levern. De huvudsakliga metabolismvägarna är konjugering till glukuronider och sulfater. Den sistnämnda vägen mättas snabbt vid doser som är högre än den terapeutiska dosen. En mindre andel metaboliseras med cytokrom P450 (främst CYP2E1) som katalysator, och bildar den reaktiva intermediermetaboliten (N-acetyl-bensokinon-imin). Oftast avgiftas den snabbt genom glutationens inverkan och elimineras via urinen som cystein och merkaptursyrekonjugat. Vid allvarlig förgiftning ökar mängden av den toxiska metaboliten.

Eliminering

Elimineringen sker huvudsakligen via urinen. 90 % av den administrerade dosen elimineras genom renal utsöndring inom 24 timmar, huvudsakligen som glukuronid- (60–80 %) och sulfatkonjugat (20–30 %). Mindre än 5 % elimineras oförändrat.

Elimineringens halveringstid är ungefär 2 timmar.

Fysiopatologiska variationer

Nedsatt njurfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 10 ml/min) är elimineringen av paracetamol och dess metaboliter reducerad.

Åldringar. Konjugeringskapaciteten ändras inte med åldern.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurstudier på råttor och möss undersöktes akut, subkronisk och kronisk toxicitet hos paracetamol, varvid det konstaterades gastrointestinala lesioner, förändringar i blodstatus, skador i leverns och njurarnas vävnader, och till och med nekros. Dessa förändringar anses bero dels på paracetamolets verkningsmekanism, dels på dess metabolism. Metaboliter som kan antas ha toxiska effekter och därmed förknippade organförändringar har också identifierats hos människor. Dessutom har mycket sällsynta fall av reversibel kronisk aggressiv hepatitis observerats vid långvarig (ett år) kontinuerlig användning med höga terapeutiska doser. Toxicitetssymtom kan uppstå efter 3 veckor med subtoxiska doser. Därför bör paracetamol inte användas under långa perioder eller i höga doser.

Omfattande studier har visat att paracetamol inte utgör någon relevant risk för gentoxicitet vid terapeutiska eller icke-toxiska doser.

Långtidsstudier på råtta och mus har inte visat att paracetamol har relevanta tumörframkallande effekter vid icke-hepatotoxiska doser.

Paracetamol passerar genom placenta.

Djurstudier och hittillsvarande erfarenhet från människa tyder inte på reproductionstoxicitet för paracetamol.

Det saknas konventionella reproduktions- och utvecklingstoxikologiska studier som är utförda enligt gällande riktlinjer.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmänen

Beläggning av paracetamolkristaller:

Basisk butylerad metakrylatsampolymer
30-procentig polyakrylatdispersion

Kiseldioxid, hydrofob, kolloidal

Tablettens basmaterial:

Mannitol (granulat, pulver)

Krospovidon

Aspartam (E951)

Bananarom

Magnesiumstearat

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förfäcknings typ och innehåll

Rivbar, barnsäker blisterförpackning: polyamid/PVC/aluminiumblister, aluminium/PET-film.
Förpackningsstorlekar: 12 eller 24 tablettar.

Eventuellt kommer inte alla förfäckningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

17001

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 22.1.2003

Datum för den senaste förnyelsen: 22.5.2008

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

19.09.2022