

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zanipress 10 mg/10 mg kalvopäälysteiset tabletit

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäälysteinen tabletti sisältää 10 mg enalpriilimaaleaattia (vastaan 7,64 mg enalpriilia) ja 10 mg lerkanidipiinihydrokloridia (vastaan 9,44 mg lerkanidipiinia).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 102,0 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Kalvopäälysteinen tabletti.

Valkoinen, kaksoiskupera, pyöreä tabletti, koko 8,5 mm.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Essentiaalin verenpainetaudin hoito tapauksissa, jolloin verenpainetta ei ole saatu riittävästi hallintaan pelkällä 10 mg:n lerkanidipiiniannoksella.

Kiinteää Zanipress 10 mg/10 mg -yhdistelmää ei tule käyttää verenpainetaudin hoidon aloitukseen.

4.2 Annostus ja antotapa

Jos potilaan verenpainetta ei saada riittävän hyvin hallintaan pelkällä 10 mg:n lerkanidipiiniannoksella, hänen lerkanidipiiniannoksensa voidaan suurentaa 20 mg:aan tai pelkkä lerkanidipiinihoitona voidaan korvata Zanipress 10 mg/10 mg -yhdistelmähoidolla. Yksilöllistä vaikuttavien aineiden annostrausta voidaan suositella. Suoraa siirtymistä monoterapiasta yhdistelmähoitoon voidaan harkita, jos se on klinisesti tarkoituksenmukaista.

Annostus

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa vähintään 15 minuuttia ennen ateriaa.

Iäkkääät:

Annos riippuu potilaan munuaisten toiminnasta (ks. "Käyttö munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä").

Munuaisten vajaatoiminta:

Zanipress-valmisteen käyttö on vasta-aileista, jos potilas sairastaa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiiniinipuhdistuma < 30 ml/min) tai jos potilas saa hemodialysis-hoitoa (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Erityinen varovaisuus on tarpeen, kun lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoa aloitetaan.

Maksan vajaatoiminta:

Zanipress-valmisteen käyttö on vasta-aileista, jos potilas sairastaa vaikeaa maksan vajaatoimintaa. Erityinen varovaisuus on tarpeen, kun lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoa aloitetaan.

Pediatriset potilaat:

Ei ole asianmukaista käyttää Zanipress-valmistetta pediatrisille potilaille verenpainetaudin hoitoon.

Antotapa

Varotoimet ennen lääkevalmisteen käsitelystä ja antamista:

- Lääkevalmiste otetaan mieluiten aamulla vähintään 15 minuuttia ennen aamiaista.
- Lääkevalmistetta ei saa ottaa greippimehun kanssa (ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

4.3 Vasta-aiheet

- Yliherkkyys ACE:n estäjille tai dihydropyridiiniryhmän kalsiumkanavan salpaajille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Potilaalla on aiemmin esiintynyt angioedeema ACE:n estäjähoidon yhteydessä.
- Perinnöllinen tai idiopaattinen angioedeema.
- Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).
- Vasemman kammon ulosvirtauseste.
- Hoitamaton kongestiivinen sydämen vajaatoiminta.
- Epästabili angina pectoris tai äskettäin (edeltävän 1 kuukauden aikana) tapahtunut sydäninfarkti.
- Vaikea maksan vajaatoiminta.
- Vaikea munuaisten vajaatoiminta ($GFR < 30 \text{ ml/min}$), mukaan lukien dialyysihoitoa saavat potilaat.
- Samanaikainen seuraavien aineiden käyttö:
 - voimakkaat CYP3A4:n estäjät (ks. kohta 4.5)
 - siklosporiini (ks. kohta 4.5)
 - greippi tai greippimehu (ks. kohta 4.5)
- Samanaikainen käyttö sakubitriilia ja valsartaania sisältävän yhdistelmävalmisteen kanssa. Enalapriilihoitoa ei saa aloittaa ennen kuin viimeisen sakubitriilia ja valsartaania sisältävän yhdistelmävalmisteannoksen ottamisesta on kulunut vähintään 36 tuntia (ks. myös kohdat 4.4 ja 4.5).

Zanipress-valmisteen samanaikainen käyttö aliskireenia sisältävien valmisteiden kanssa on vasta-aiheista, jos potilaalla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ($GFR < 60 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$) (ks. kohdat 4.5 ja 5.1).

4.4 Varoitukset ja käytöön liittyvät varotoimet

Symptomaattinen hypotensio

Symptomaattinen hypotensio on harvinainen komplisoitumatonta hypertensiota potevilla. Enalapriilia käyttäville hypertensiopotilaalle tulee symptomaahtista hypotensiota todennäköisemmin silloin, kun potilaalla on ollut volyyminvaje esim. diureettihoidon, suolarajoituksen, dialysisin, ripulin tai oksentelun takia (ks. kohta 4.5). Symptomaattista hypotensiota on havaittu sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla riippumatta siitä, onko potilaalla myös munuaisten vajaatoimintaa.

Symptomaattista hypotensiota ilmenee todennäköisemmin potilailla, joilla on vaikea sydämen vajaatoiminta ja siksi heillä on suuria loop-diureettiaanoksia, hyponatremiaa tai munuaisten vajaatoimintaa. Näiden potilaiden hoito tulee aloittaa lääkärin valvonnassa ja potilaiden tilaa tulee seurata tarkasti aina kun enalapriili- ja/tai diureettiaanosta muutetaan. Samat toimenpiteet ovat mahdollisesti tarpeen, jos potilaalla on iskeeminen sydänsairaus tai aivoverisuonisairaus, jolloin liiallinen verenpaineen aleneminen saattaa aiheuttaa sydäninfarktin tai aivoverenkierton häiriön. Jos hypotensiota ilmenee, potilas tulee asettaa makuuasentoon ja hänen tulee tarvittaessa antaa fysiologista keittosuolaliuosta laskimoinfusiona. Ohimenevä hypotensiivinen vaste ei ole hoidon jatkamisen vasta-aihe; hoitoa voidaan tavallisesti jatkaa ongelmitta sen jälkeen, kun verenpaine on kohonnut volyymin lisäämisen jälkeen.

Joidenkin sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden, joiden verenpaine on normaali tai alhainen, verenpaine voi alentua edelleen enalapriilihoidon aikana. Tämä vaikutus on odotettu eikä sen takia

tavallisesti tarvitse lopettaa hoitoa. Jos hypotensio muuttuu symptomaaattiseksi, annoksen pienentäminen ja/tai diureetti- ja/tai enalapriilihoidon lopettaminen saattaa olla tarpeen.

Sairas sinus -oireyhtymä

Lerkanidipiinia pitää antaa varoen potilaille, joilla on sairas sinus -oireyhtymä (ilman tahdistinta).

Vasemman kammion vajaatoiminta

Vaikka kontrolloiduissa hemodynamiaikkatukimuksissa ei todettu kammiotoiminnan heikentymistä, varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on vasemman kammion toimintahäiriö.

Iskeeminen sydänsairaus

On esitetty, että erääät lyhytvaikutteiset dihydropyridiinit saattavat suurentaa iskeemistä sydänsairautta sairastavien potilaiden kardiovaskulaarista riskiä. Vaikka lerkanidipiini on pitkävaikutteinen, varovaisuus on tarpeen hoidettaessa näitä potilaita. Harvinaisissa tapauksissa jotkut dihydropyridiinit saattavat aiheuttaa kipua sydänalassa tai angina pectorista. Hyvin harvoin angina pectorista sairastaville potilaille saattaa tulla kohtauksia useammin tai kohtaukset saattavat olla pitkäkestoisia tai vaikeampia. Yksittäisiä sydäninfarkteja saattaa esiintyä (ks. kohta 4.8).

Munuaisten vajaatoiminta

Erityinen varovaisuus on tarpeen, kun lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat aloittavat enalapriilihoidon. Rutiininomainen seerumin kalium- ja kreatiiniipitoisuuden seuranta enalapriilihoidon aikana on osa näiden potilaiden normaalialia hoitoa.

Enalapriiliin käytön yhteydessä on raportoitu ilmenneen munuaisten vajaatoimintaa, erityisesti potilaille, joilla on valkea sydämen vajaatoiminta tai perussairautena munuaissairaus, mukaan lukien munuaisvaltimon ahtauma. Jos enalapriilihoidon aikana ilmenevä munuaisten vajaatoiminta diagnostoidaan nopeasti ja hoidetaan asianmukaisesti, se on tavallisesti korjaantuvaa.

Joillakin hypertensiivillisillä potilailla, joilla ei ole aiempaa munuaissairautta, enalapriiliin ja diureetin samanaikainen käyttö saattaa suurentaa veren urea- ja kreatiiniipitoisuutta. Enalapriiliannoksen pienentäminen ja/tai diureettihoidon lopettaminen saattaa olla tarpeen. Näissä tapauksissa tulee ottaa huomioon taustalla olevan munuaisvaltimon ahtauman mahdollisuus (ks. kohta 4.4, Renovaskulaarinen hypertensio).

Renovaskulaarinen hypertensio

Jos potilaalla on molemminpuolinen munuaisvaltimon ahtauma tai ainoan toimivan munuaisen valtimon ahtauma, hänen on erityinen hypotension ja munuaisten vajaatoiminnan kehittymisen riski ACE:n estäjähoidon aikana. Munuaisten toiminta voi heikentyä, vaikka seerumin kreatiiniipitoisuus muuttuisi vain vähän. Näiden potilaiden hoito tulisi aloittaa tarkassa lääkärin valvonnassa pienillä annoksilla, varovaisella titrauksella ja munuaisten toimintaa seuraamalla.

Munuaisesiirto

Lerkanidipiin in tai enalapriiliin käytöstä sellaisten potilaiden hoitoon, joille on äskettäin tehty munuaisesiirto, ei ole kokemuksia. Tämän vuoksi näille potilaille ei suositella Zanipress-hoitoa.

Maksan vajaatoiminta

Lerkanidipiinin verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua, jos potilaalla on maksan vajaatoiminta.

ACE:n estäjähöitoon on harvoin liittynyt oireyhtymä, joka alkaa keltaisuudella tai maksatulehdusella ja etenee äkilliseen maksanekroosiin ja johtaa (joskus) kuolemaan. Tämän oireyhtymän mekanismia ei tunneta. Jos ACE:n estäjähöitoa saavalla potilaalla esiintyy keltaisuutta tai huomattavaa maksaentsyymien nousua, tulee ACE:n estäjähöito keskeyttää ja asianmukainen seuranta aloittaa.

Peritoneaalidialyysi

Lerkanidipiin in käyttöön on liittynyt peritoneaalidialysispotilailla samean peritonealinesteen kehittymistä. Sameus johtuu peritonealinesteen triglyseridipitoisuuden suurenemisesta. Tämän ilmiön mekanismia ei tunneta, ja sameus häviää yleensä pian lerkanidipiinhoidon lopettamisen jälkeen. Tämä on tärkeää tunnistaa, sillä sameaa peritonealinestettä voidaan erehtyä pitämään merkkinä

infektioperäisestä vatsakalvotulehduksesta, joka tällöin tarpeettomasti johtaisi sairaalahoitoon ja empiiriiseen antibioottihoitoon.

Neutropenia/agranulosytoosi

Neutropeniaa/agranulosytoosia, trombosytopeniaa ja anemiaa on raportoitu ilmenneen ACE:n estäjää käyttäville potilaille. Neutropenia on harvinainen, jos potilaan munuaisten toiminta on normaalista eikä hänen läellä ole erityisiä riskitekijöitä. Enalapriiliin käytön yhteydessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, jos potilaalla on verisuonten kollageenisairaus, jos potilasta hoidetaan immuno-suppressiivisilla lääkkeillä, allopurinolilla, prokaiamiidilla tai jos potilaalla on useita näistä riskitekijöistä, erityisesti jos munuaisten toiminta on ennestään heikentynyt. Joillakin näistä potilaista esiintyy vaikeita infektioita, jotka harvoissa tapauksissa eivät reagoineet intensiiviseen antibioottihoitoon. Jos tällaiset potilaat käyttävät enalapriilia, leukosyyttien säännöllinen seuranta on suositeltavaa, ja potilaita tulisi kehottaa kertomaan kaikista infektioihin merkeistä lääkärilleen.

Yliherkkyyys / angioneuroottinen edeema

Angioneuroottista edeemaa kasvoissa, rajoissa, huulissa, kielessä, äänihuulissa ja/tai kurkunpäässä on raportoitu esiintyneen ACE:n estäjillä, myös enalapriillilla, hoidetuilla potilailta. Sitä voi esiintyä milloin tahansa hoidon aikana. Tällaisessa tapauksessa enalapriilihoito tulee lopettaa välittömästi. Potilaan tilaa tulee seurata huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että oireet ovat kokonaan poissa ennen kotiuttamista. Niissäkin tapauksissa, joissa vain kieli on turvonnut eikä hengitysvaikeuksia ole ollut, potilaat saattavat tarvita pidempää seurantaa, sillä antihistamiini- ja kortikosteroidihoido ei väältämättä ole riittävä.

Sellaisen angioedeeman, johon on liittynyt kurkunpää tai kielen turvotusta, on hyvin harvoissa tapauksissa raportoitu johtaneen kuolemaan. Potilailla, joilla kieli, äänihuulet tai nielu on turvonnut, hengitystiet todennäköisesti ahtautuvat, etenkin, jos aiemmin on tehty hengitysteihin liittynyt leikkaus. Jos turvotusta esiintyy kielessä, äänihuulissa tai nielussa, jolloin voi aiheutua hengitystietukos, asianmukainen hoito tulee aloittaa viipymättä, esim. adrenaliiniliuoksen antaminen ihon alle (0,3–0,5 ml [laimennussuhde 1:1000]) ja/tai varmistaa potilaan hengitysteiden auki pysyminen. Mustaihoisille potilaille on raportoitu ilmenneen angioedeemaa ACE:n estäjien käytön yhteydessä useammin kuin ei-mustaihoisille potilaille.

Jos potilaalla on aiemmin ollut angioedeemaa, joka ei ole aiheutunut ACE:n estäjästä, hänen läellä saattaa olla suurempi riski angioedeeman kehittymiselle, kun häntä hoidetaan ACE:n estäjällä (ks. kohta 4.3). ACE:n estäjien samanaikainen käyttö sakubitriilia ja valsartaania sisältävän yhdistelmävalmisteen kanssa on vasta-aiheista lisääntyneen angioedeeman riskin vuoksi. Hoitoa sakubitriilia ja valsartaania sisältävällä yhdistelmävalmisteella ei saa aloittaa ennen kuin viimeisen enalapriiliannoksen ottamisesta on kulunut vähintään 36 tuntia. Enalapriilihoitoa ei saa aloittaa ennen kuin viimeisen sakubitriilia ja valsartaania sisältävän yhdistelmävalmisteannoksen ottamisesta on kulunut vähintään 36 tuntia (ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

ACE:n estäjien samanaikainen käyttö rasekadotriiliin, mTOR:n estäjien (esim. sirolimuusin, everolimuusin, temsirolimuusin) ja vildagliptiinin kanssa saattaa lisätä angioedeeman (esim. hengitysteiden tai kielen turpoaminen, johon saattaa liittyä hengityksen heikentymistä) riskiä (ks. kohta 4.5). Jos potilas käyttää jo ennestään jotakin ACE:n estäjää, rasekadotriiliin, mTOR:n estäjien (esim. sirolimuusin, everolimuusin, temsirolimuusin) ja vildagliptiinin käytön aloittamisessa pitää olla varovainen.

Anafylaktoidiset reaktiot hyönteisten myrkyn siedätyshoidon aikana

Henkeä uhkaavia anafylaktoidireaktioita on esiintynyt harvoin, kun hyönteisten myrkyn siedätyshoidon aikana on samanaikaisesti käytetty ACE:n estäjää. Nämä reaktiot voidaan välttää keskeyttämällä ACE:n estäjähoito ennen kutakin siedätyshoitokertaa.

Anafylaktoidiset reaktiot LDL-afereesin aikana

Henkeä uhkaavia anafylaktoidireaktioita on esiintynyt harvoin, kun ACE:n estäjää on käytetty samanaikaisesti dekstraanisulfaatilla toteutetun LDL-afereesin kanssa. Nämä reaktiot voidaan välttää keskeyttämällä ACE:n estäjähoito ennen kutakin afereesia.

Hypoglykemia

Veren glukoosipitoisuutta tulee seurata tarkasti ensimmäisen kuukauden aikana, kun ACE:n estääjähoito aloitetaan diabeetikolle, jota hoidetaan suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä tai insuliinilla (ks. kohta 4.5).

Yskä

Yskää on raportoitu ACE:n estäjien käytön yhteydessä. Yskään ei tavallisesti liity limanmuodostusta, se on sitkeää ja se rauhoittuu hoidon lopettamisen jälkeen. ACE:n estäjän aiheuttama yskä tulee myös ottaa huomioon tehtäessä yskän erotusdiagnostiikkaa.

Leikkaus/anestesia

Jos potilaalle tehdään suuri leikkaus tai hänet nukutetaan aineilla, jotka alentavat verenpainetta, enalapriili estää kompensatorisen reniinierityksen aiheuttamaa angiotensiini II:n muodostumista. Jos tämän mekanismin seurauksena tulee hypotensiota, se voidaan korjata volyymilisällä.

Seerumin kaliumpitoisuus

ACE:n estäjät voivat aiheuttaa hyperkalemiaa, koska ne estävät aldosteronin vapautumista. Jos potilaan munuaisten toiminta on normaali, tällainen vaikutus ei tavallisesti ole merkittävä. Hyperkalemia on kuitenkin mahdollinen, jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa ja/tai potilas käyttää kaliumlisää (mukaan lukien suolankorvikkeita), kaliumia säästäviä diureetteja, trimetopriimia tai kotrimoksatsolia (eli trimetopriimia ja sulfametoksatsolia sisältävä yhdistelmävalmistetta), ja etenkin jos potilas käyttää aldosteronin estäjiä tai angiotensiinireseptorin salpaajia. Jos potilas käyttää ACE:n estäjiä, kaliumia säästävien diureettien ja angiotensiinireseptorin salpaajien käytössä pitää olla varovainen, ja seerumin kaliumpitoisuutta ja munuaisten toimintaa pitää seurata (ks. kohta 4.5).

Litium

Litiumin ja enalapriilin yhteiskäyttöä ei yleisesti ottaen suositella (ks. kohta 4.5).

Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän (RAA-järjestelmä) kaksoisesta

On olemassa näyttöä siitä, että ACE:n estäjien, angiotensiini II -reseptorin salpaajien tai aliskireenin samanaikainen käyttö suurentaa hypotension, hyperkalemian ja munuaisten toiminnan heikkenemisen (mukaan lukien akuutin munuaisten vajaatoiminnan) riskiä. Sen vuoksi RAA-järjestelmän kaksoisesta ACE:n estäjien, angiotensiini II -reseptorin salpaajien tai aliskireenin samanaikaisen käytön avulla ei suositella (ks. kohdat 4.5 ja 5.1).

Jos kaksoisestohoitoa pidetään täysin välttämättömänä, sitä on annettava vain erikoislääkärin valvonnassa ja munuaisten toimintaa, elektrolyttejä ja verenpainetta on tarkkailtava tiheästi ja huolellisesti.

ACE:n estäjää ja angiotensiini II -reseptorin salpaajia ei pidä käyttää samanaikaisesti potilaille, joilla on diabeettinen nefropatia.

CYP3A4-induktorit

CYP3A4-induktorit, kuten antikonvulsantit (esim. fenytoiini, karbamatsepiini) ja rifampisiini, saattavat pienentää plasman lerkanidipiinipitoisuutta siten, että lerkanidipiinin teho voi heikentyä odotetusta (ks. kohta 4.5).

Etniset erot

Kuten muidenkin ACE:n estäjien, enalapriilin verenpainetta alentava vaikutus on heikompi mustaihoinilla kuin ei-mustaihoinilla potilailla, mahdollisesti sen vuoksi, että plasman reniinitasot ovat usein alempia mustaihoinilla hypertensiivillisillä henkilöillä.

Raskaus

Zanipress-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.

ACE:n estäjien, kuten enalapriilin, käyttöä ei tule aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjää käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan,

ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 ja 4.6).

Myöskään lerkanidipiinin käyttöä ei suositella raskauden aikana tai raskautta suunnitteleville naisille (ks. kohta 4.6).

Imetyks

Zanipress-valmisten käyttöä ei suositella imetyksen aikana (ks. kohta 4.6).

Pediatriset potilaat

Tämän yhdistelmän turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu lapsilla.

Alkoholi

Alkoholin käyttöä tulisi välttää, sillä alkoholi saattaa voimistaa verisuonia laajentavien verenpainelääkkeiden vaikutusta (ks. kohta 4.5).

Laktoosi

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosintoleranssi, täydellinen laktaasinpuitos tai glukoosi-galaktoosi-imetyymishäiriö, ei pidä käyttää tästä lääkettä.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muut verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten diureetit, beetasalpaajat, alfasalpaajat ja muut aineet, saattavat voimistaa Zanipress-valmisten verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Seuraavia yhteisvaikutuksia on lisäksi havaittu yhdistelmävalmisten jommankumman vaikuttavan aineen kanssa.

Enalapriilimaleaatti

Angioedeeman riskiä lisäävät lääkkeet

ACE:n estäjien samanaikainen käyttö sakubitriilia ja valsartaania sisältävän yhdistelmävalmisten kanssa on vasta-aiheista, koska se lisää angioedeeman riskiä (ks. kohta 4.3 ja 4.4).

ACE:n estäjien samanaikainen käyttö rasekadotriilin, mTOR:n estäjien (esim. sirolimuusin, everolimuusin, temsirolimuusin) ja vildagliptiinin kanssa voi aiheuttaa lisääntyneen angioedeeman riskin (ks. kohta 4.4).

Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän (RAA-järjestelmän) kaksoisesta

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän (RAA-järjestelmä) kaksoisestoon ACE:n estäjien, angiotensiini II -reseptorin salpaajien tai aliskireenin samanaikaisen käytön avulla liittyy haittavaikutusten, esimerkiksi hypotension, hyperkalemian ja munuaisten toiminnan heikkenemisen (mukaan lukien akutin munuaisten vajaatoiminnan) suurentunut esiintyvyys vain yhden RAA-järjestelmään vaikuttavan aineen käyttöön verrattuna (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.1).

Kaliumia säästäävät diureetit, kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet

Vaikka seerumin kaliumpitoisuus pysyy tavallisesti normaalirajoissa, joillakin enalapriilihoitoa saavilla potilailla voi esiintyä hyperkalemiaa. Kaliumia säästäävistä diureeteista (esim. spironolaktonista, triamtereenista tai amiloridista), kaliumlisistä tai kaliumia sisältävistä suolankorvikkeista voi aiheutua huomattavasti suurentunut seerumin kaliumpitoisuus. Hoidossa on oltava varovainen myös, jos enalapriilin kanssa samanaikaisesti käytetään muita lääkeaineita, jotka

suurentavat seerumin kaliumpitoisuutta, kuten trimetopriimia ja kotrimoksatsolia (trimetopriimia ja sulfametoksatsolia sisältävä yhdistelmävalmiste), sillä trimetopriimilla tiedetään olevan amiloridin kaltainen kaliumia säästävä diureettivaikutus. Enalapriiliin ja edellä mainittujen lääkkeiden käyttöä yhdistelmänä ei sen vuoksi suositella. Jos samanaikainen käyttö on aiheellista, hoidossa on oltava varovainen, ja seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava tihein väliajoin.

Siklosporiini

ACE:n estäjien ja siklosporiinin samanaikaisessa käytössä voi esiintyä hyperkalemiaa. Seerumin kaliumpitoisuuden seurantaa suositellaan.

Hepariini

ACE:n estäjien ja hepariinin samanaikaisessa käytössä voi esiintyä hyperkalemiaa. Seerumin kaliumpitoisuuden seurantaa suositellaan.

Diureetit (tiatsidit tai loop-diureetit)

Aiempi suurten diureettiamosten käyttö saattaa aiheuttaa volyymivajeen ja hypotension riskin enalapriilihoitoa aloittaessa (ks. kohta 4.4). Hypotensiivistä vaikutusta voidaan vähentää lopettamalla diureetin käyttö, korjaamalla volyymivaje tai antamalla suolaa tai aloittamalla enalapriilihoito pienellä annoksella.

Muut verenpainelääkkeet

Muiden verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa lisätä enalapriiliin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Nitroglyseriinin ja muiden nitraattien tai muiden verisuonia laajentavien aineiden samanaikainen käyttö saattaa alentaa verenpainetta edelleen.

Litium

Seerumin litiumpitoisuuden korjautuvaan suurenemista ja toksisia vaikutuksia on raportoitu, kun lithiumia ja ACE:n estäjiä on käytetty samanaikaisesti. Tiatsididiureettien ja ACE:n estäjien samanaikainen käyttö saattaa suurentaa seerumin litiumpitoisuutta ja siten suurentaa litiumtokesisuuden riskiä. Enalapriiliin samanaikaista käyttöä lithiumin kanssa ei sen vuoksi suositella, mutta jos tämän yhdistelmän käyttö on vältämätöntä, seerumin litiumtasoa tulee seurata tarkasti (ks. kohta 4.4).

Trisykliset masennuslääkkeet / psykoosilääkkeet / anestesia-aineet / narkoottiset aineet

Tiettyjen anestesia-aineiden, trisyklisten masennuslääkkeiden ja psykoosilääkkeiden samanaikainen käyttö ACE:n estäjien kanssa saattaa alentaa verenpainetta edelleen (ks. kohta 4.4).

Tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet), mukaan lukien selektiiviset syklo-oksigenaasi 2:n (COX-2:n) estäjät

Tulehduskipulääkkeiden, mukaan lukien selektiivisten COX-2:n estäjien käyttö saattaa heikentää diureettien ja muiden verenpainelääkkeiden tehoa. Sen vuoksi tulehduskipulääkkeet, mukaan lukien selektiiviset COX-2:n estäjät, voivat heikentää angiotensiini II -reseptorin salpaajien tai ACE:n estäjien verenpainetta alentavaa tehoa.

Tulehduskipulääkkeiden (mukaan lukien COX 2:n estäjien) samanaikainen anto angiotensiini II -reseptorin salpaajien tai ACE:n estäjien kanssa suurentaa edelleen seerumin kaliumpitoisuutta, mikä saattaa johtaa munuaisten toiminnan heikentymiseen. Nämä vaikutukset ovat tavallisesti korjautuvia. Harvoin voi esiintyä akuuttia munuaisten vajaatoimintaa, erityisesti jos potilaan munuaisten toiminta on heikentynyt (esim. ikääntyneillä tai potilailla, joilla on vähentynyt veren tilavuus mukaan lukien potilaat, jotka saavat diureettista hoitoa). Tämän vuoksi yhdistelmän käytössä pitää noudattaa varovaisuutta, kun potilaan munuaisten toiminta on heikentynyttä. Potilaiden nesteytyksen pitää olla riittävää, ja munuaisten toiminnan seuraamista pitää harkita samanaikaisen hoidon aloituksen jälkeen ja säännöllisesti sen jälkeen.

Kulta

Potilaille, joita hoidetaan kultainjektiolla (natriumaurotiomalaatti) ja samanaikaisesti ACE:n estäjällä, myös enalapriillillä, on raportoitu ilmenneen joskus nitritoidisia reaktioita (oireita ovat mm. kasvojen punoitus, pahoinvointi, oksentelu ja hypotensio).

Sympatomimeetit

Sympatomimeetit saattavat vähentää ACE:n estäjien verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Diabeteslääkkeet

Epidemiologisten tutkimusten perusteella ACE:n estäjien ja diabeteslääkkeiden (insuliini, suun kautta otettavat diabeteslääkkeet) yhteiskäyttö voi lisätä verensokeria alentavaa vaikutusta, mihin liittyy hypoglykemian riski. Tällaisia tapauksia esiintyy todennäköisemmin yhteiskäytön muutaman ensimmäisen viikon aikana ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Alkoholi

Alkoholi voimistaa ACE:n estäjien verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Asetyylialisyylihappo, trombolytit ja beetasalpaajat

Enalapriilia voidaan käyttää ongelmitta samanaikaisesti asetyylialisyylihapon (annoksina, jotka sopivat sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn), trombolyttien ja beetasalpaajien kanssa.

Lerkanidipiini

Yhdistelmät, joiden samanaikainen käyttö on vasta-aiheista

CYP3A4:n estäjät

Lerkanidipiinin tiedetään metaboloituvan CYP3A4-entsyymin välityksellä. Tämän vuoksi CYP3A4-entsyymin estäjien samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa lerkanidipiinin metabolismaan ja eliminaatioon. Yhteisvaikutustutkimuksessa, jossa käytettiin voimakasta CYP3A4-entsyymin estääjää ketokonatsolia, lerkanidipiinipitoisuus plasmassa suureni huomattavasti (S-lerkanidipiinin pitoisuuspinta-alan (AUC) 15-kertainen suureneminen ja C_{max} -arvon 8-kertainen suureneminen). Lerkanidipiinin ja CYP3A4-entsyymin estäjien (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, ritonavíiri, erytromysiini, troleandomysiini, klaritromysiini) samanaikaista käyttöä pitäisi välttää (ks. kohta 4.3).

Siklosporiini

Siklosporiinin ja lerkanidipiinin samanaikaisen käytön on havaittu johtavan molempien lääkeaineiden suurentuneisiin pitoisuksiin plasmassa. Kun terveille nuorille vapaaehtoisille tehyssä tutkimuksessa annettiin siklosporiinia 3 tuntia lerkanidipiinin annon jälkeen, plasman lerkanidipiinipitoisuus ei muuttunut, mutta siklosporiinin AUC suureni 27 %. Kun lerkanidipiinia ja siklosporiinia annettiin samanaikaisesti, lerkanidipiinin pitoisuus suureni kuitenkin kolminkertaiseksi ja siklosporiinin AUC suureni 21 %.

Siklosporiinia ja lerkanidipiinia ei pitäisi käyttää samanaikaisesti (ks. kohta 4.3).

Greippi tai greippimehu

Kuten muidenkin dihydropyridiinien, myös lerkanidipiinin metabolismia on herkkä greipin ja greippimehun estävälle vaikutukselle, mikä lisää lerkanidipiinin systeemistä hyötyosuutta ja voimistaa verenpaineen laskua. Lerkanidipiinia ei pitäisi käyttää samanaikaisesti greipin tai greippimehun kanssa (ks. kohta 4.3).

Samanaikaista käyttöä ei suositella

CYP3A4:n induktorit

Lerkanidipiinin ja CYP3A4:n induktoreiden, kuten antikonvulsantien (esim. fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatepiini) ja rifampisiinin, yhteiskäytöön pitäisi suhtautua varovaisesti, koska verenpainetta alentava vaikutus saattaa heikentyä. Verenpainetta pitää seurata tavallista tiheämmin yhteiskäytön aikana (ks. kohta 4.4).

Alkoholi

Alkoholin käyttöä tulisi välttää, sillä alkoholi saattaa voimistaa verisuonia laajentavien verenpaineelääkkeiden vaikutusta (ks. kohta 4.4).

Varotoimet mukaan lukien annoksen muuttaminen

CYP3A4:n substraatit

Varovaisuus on tarpeen, jos potilaalle määräätään samanaikaisesti lerkaniidiin ja muita CYP3A4:n substraatteja, kuten terfenadiinia, astemitsolia, luokan III rytmihäiriölääkkeitä, kuten. amiodaronia, kinidiiniä ja sotalolia.

Midatsolaami

Kun vapaaehtoisille, iäkkäille potilaille annettiin lerkaniidiin (20 mg) yhdessä midatsolaamini kanssa suun kautta, lerkaniidiinin imeytyminen lisääntyi (noin 40 %) ja imeytymisnopeus hidastui (t_{max} piteni 1,75 tunnistaa 3 tuntiin). Midatsolaamin pitoisuudet eivät muuttuneet.

Metoprololi

Kun lerkaniidiin annettiin yhdessä metoprololin kanssa, joka on pääasiassa maksassa eliminoitava beetasalpaaja, metoprololin biologinen hyötyosuuus pysyi muuttumattomana, mutta lerkaniidiinin hyötyosuuus pieneni 50 %. Tällainen vaikutus saattaa johtua beetasalpaajien aiheuttamasta maksan verenkierron vähennemisestä, ja näin saattaa siitä syystä tapahtua myös muiden saman ryhmän lääkkeiden käytön yhteydessä. Lerkaniidiin voidaan siis antaa turvallisesti yhdessä β -adrenergisten salpaajien kanssa, mutta annoksen muuttaminen saattaa olla aiheellista.

Digoksiini

Kun β -metyyldigoksiinilla jatkuvasti hoidettaville potilaille annettiin samanaikaisesti 20 mg:n annos lerkaniidiin, ei havaittu farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia. Digoksiinin C_{max} -arvo kuitenkin suureni keskimäärin 33 %, mutta AUC-arvo tai munuaispuhdistuma eivät muuttuneet merkitsevästi. Jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti digoksiinilla, heidän tilaansa tulee seurata tarkasti klinisesti digoksiinitoksisuuden merkkien huomaamiseksi.

Samanaikainen käyttö muiden lääkkeiden kanssa

Fluoksetiini

Kun tutkittiin yhteisvaikutuksia fluoksetiinin (CYP2D6- ja CYP3A4-estäjä) kanssa terveillä vapaaehtoisilla (ikä 65 ± 7 vuotta, kesiarvo \pm s.d.), ei havaittu klinisesti merkitseviä muutoksia lerkaniidiin farmakokinetiikassa.

Simetidiini

Samanaikainen simetidiinin käyttö (vuorokausiannos 800 mg) ei vaikuta plasman lerkaniidiinipitoisuukseen merkitsevästi, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa käytettäessä suurempia annoksia, sillä lerkaniidiinin biologinen hyötyosuuus saattaa suurentua, ja samalla sen verenpainetta alentava vaikutus saattaa tehostua.

Simvastatiini

Kun toistuvasti annettiin 20 mg:n lerkaniidiiniannos yhdessä 40 mg:n simvastatiiniannoksen kanssa, lerkaniidiinin AUC-arvo ei muuttunut merkitsevästi, mutta simvastatiinin AUC-arvo suureni 56 %:lla ja sen aktiivisen metaboliitin, β -hydroksihapon, arvo 28 %:lla. Näillä muutoksilla ei todennäköisesti ole kliinistä merkitystä. Yhteisvaikutuksia ei ole odotettavissa, kun lerkaniidiini otetaan aamulla ja simvastatiini suositusten mukaisesti illalla.

Varfariini

Kun terveille, paastonneille vapaaehtoisille annettiin 20 mg lerkaniidiinia, varfariinin farmakokinetiikka ei muuttunut.

Diureetit ja ACE:n estäjät

Lerkaniidiinin anto yhdessä diureettien ja ACE:n estäjien kanssa on osoittautunut turvalliseksi.

Muut verenpaineeseen vaikuttavat lääkkeet

Kuten kaikkien verenpaineelääkkeiden kohdalla, verenpainetta alentava vaikutus voi lisääntyä, kun lerkaniidiinia käytetään muiden verenpaineeseen vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi virtsaoireiden hoitoon käytettävät alfasalpaajat, trisykliset masennuslääkkeet ja

neuroleptit. Päinvastoin saattaa verenpainetta alentava vaikutus vähentyä, kun samanaikaisesti käytetään kortikosteroideja.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain aikuisilla.

4.6 He deImällisyys, raskaus ja imetyys

Raskaus

Enalapriili

ACE:n estäjien (enalapriilin) käyttöä ei suositella ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohta 4.4). ACE:n estäjien (enalapriilin) käyttö on vasta-aihista toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana suurentaa teratogeenisuursiskiä. Tulokset eivät kuitenkaan ole varkuuttavia, mutta pieni riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Ellei ACE:n estäjähoitoa katsota välttämättömäksi, raskautta toivovalle potilaalle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen verenpainelääkitys. Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjähoito on lopetettava heti ja tarvittaessa aloitettava muu lääkitys.

Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on haitallista sikiön kehitykselle (munuaisten vajaatoiminta, lapsiveden määärän pieneminen, kallon luutumisen hidastuminen) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toimintahäiriö, hypotensio ja hyperkalemia) (ks. kohta 5.3). Äideillä on ilmennyt lapsiveden vähäisyyttä, jonka oletetaan kuvaavan sikiön heikentynytä munuaisten toimintaa, joka saattaa aiheuttaa raajojen jäykistymä, kallon tai kasvojen epämuodostumia ja keuhkojen vajaakehitystä. Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, suosittelaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Lerkanidipiini

Ei ole olemassa tietoja lerkanidipiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole todettu teratogeenisia vaiktuksia (ks. kohta 5.3), mutta niitä on havaittu muilla dihydropyridiiniyhdisteillä. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä (ks. kohta 4.4).

Enalapriili ja lerkanidipiini yhdessä

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja enalapriilimaleaatin/lerkanidipiinihydrokloridin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta 5.3).

Zanipress-valmistetta ei pidä käyttää toisen eikä kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Sen käyttöä ei suositella ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetyys

Enalapriili

Vähäisten farmakokinettisten tietojen perusteella rintamaitoon erittyy lääkeainetta hyvin pieninä pitoisuksina (ks. kohta 5.2). Vaikka nämä pitoisuudet vaikuttavat kliinisesti merkityksettömiltä, enalapriilin käyttöä ei suositella imetyksen aikana, jos lapsi on ennenaikaisesti syntynyt, eikä ensimmäisten synnytyksen jälkeisten viikkojen aikana, sillä on olemassa hypoteettinen sydän- ja verisuonivaikutusten sekä munuaisvaikutusten riski, eikä kliinistä kokemusta ole riittävästi. Kun imetettävä lapsi on vanhempi, enalapriilin käyttöä äidin hoidossa voidaan harkita, jos hoitoa pidetään välttämättömänä ja lapsen tilaa tarkkaillaan haittavaikutusten varalta.

Lerkaniidipiini

Ei tiedetä, erityvätkö lerkaniidipiini/metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Vastaanotonneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Lerkaniidipiinia ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Enalapriili ja lerkaniidipiini yhdessä

Tämän vuoksi Zanipress-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Lerkaniidipiinia koskevia kliinisä tietoja ei ole käytettävissä. Siittiöiden pään korjautuvia biokemiallisia muutoksia on raportoitu havaittuin joillakin kalsiumestäjillä hoitetuista potilaista. Nämä muutokset saattavat heikentää hedelmöittämistä. Kun toistuvat koeputkihedelmöitykset epäonnistuvat eikä asialle löydy muuta syytä, tulee ottaa huomioon mahdollisuus, että syynä ovat kalsiumestäjät.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Zanipress-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa, sillä heitehuimausta, voimattomuutta, väsymystä ja harvinaisissa tapauksissa uneliaisuutta saattaa esiintyä (ks. kohta 4.8).

4.8 Haimavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenvetö

Zanipress-valmisteen turvallisuutta on arvioitu viidessä kaksoissokkoutetussa kontrolloidussa klinisessä tutkimuksessa ja kahdessa pitkäkestoisessa avoimessa jatkotutkimuksessa. Kaikkiaan 1 141 potilasta on saanut Zanipress-valmistetta (vahvuudet 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg ja 20 mg/20 mg). Yhdistelmähoidon aikana havaitut haimavaikutukset ovat samankaltaisia kuin aiemmin on havaittu jommankumman vaikuttavan aineen käytön aikana yksinään. Yleisimmin ilmoitetut haimavaikutukset Zanipress-hoidon aikana olivat yskä (4,03 %), heitehuimaus (1,67 %) ja päänsärky (1,67 %).

Haimavaikutustaulukko

Alla olevassa taulukossa klinisissä Zanipress-tutkimuksissa (vahvuudet 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg ja 20 mg/20 mg) raportoidut haimavaikutukset, joilla on kohtuullinen syysuhde hoitoon, on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmälukuksen ja seuraavan yleisyyshuokittelun mukaisesti: hyvin yleinen ($\geq 1/10$), yleinen ($\geq 1/100$, $< 1/10$), melko harvinainen ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$), harvinainen ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$), hyvin harvinainen ($< 1/10\ 000$), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esintyvyyden arviointiin).

Veri ja imukudos	
Melko harvinainen	Trombosytopenia
Harvinainen	Hemoglobiiniarvon pieneneminen
Immuunijärjestelmä	
Harvinainen	Yliherkkyyys
Aineenvaihdunta ja ravitsemus	
Melko harvinainen	Hyperkalemia
Psykkiset häiriöt	
Melko harvinainen	Ahdistuneisuus
Hermosto	
Yleinen	Heitehuimaus, päänsärky
Melko harvinainen	Asentohuimaus
Kuulo ja tasapainoelin	
Melko harvinainen	Kiertohuimaus

Harvinainen	Tinnitus
Sydän	
Melko harvinainen	Takykardia, palpitaatiot
Verisuonisto	
Melko harvinainen	Punoitus, hypotensio
Harvinainen	Verenkierron romahtaminen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina	
Yleinen	Yskä
Harvinainen	Kurkun kuivuminen, kipu suussa ja nielussa
Ruoansulatuselimistö	
Melko harvinainen	Vatsakipu, ummetus, pahoinvoiointi
Harvinainen	Ruoansulatushäiriöt, huulten turvotus, kielen häiriö, ripuli, suun kuivuuus, ientulehdus
Maksaja sappi	
Melko harvinainen	ALAT-arvon suureneminen, ASAT-arvon suureneminen
Iho ja ihonalainen kudos	
Melko harvinainen	Eryteema
Harvinainen	Angioedeema, kasvojen turvotus, ihotulehdus, ihottuma, urtikaria
Luusto, lihakset ja sidekudos	
Melko harvinainen	Nivelkipu
Munuaiset ja virtsatiet	
Melko harvinainen	Pollakisuria
Harvinainen	Nokturia, polyuria
Sukupuolielimet ja rinnat	
Harvinainen	Erektiohäiriöt
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	
Melko harvinainen	Astenia, uupumus, kuumuuden tunne, ääreisturvotus

Vain yhdellä potilaalla esiintyneet haittavaikutukset on luokiteltu harvinaiseksi.

Lisätietoja yksittäisistä komponenteista

Toisella valmisteen vaikuttavista aineista (enalapriili tai lerkaniidiini) raportoituja haittavaikutuksia voi mahdollisesti esiintyä myös Zanipress-valmisten käytön yhteydessä, vaikka niitä ei olisi havaittu kliniisissä tutkimuksissa tai valmisten markkinoille tulon jälkeisessä käytössä.

Pelkkä enalapriili

Enalapriiliin on raportoitu aiheuttaneen mm. seuraavia haittavaikutuksia:

Veri ja imukudos:

Melko harvinainen: anemia (mukaan lukien aplastinen ja hemolyttinen)

Harvinainen: neutropenia, hemoglobiiniarvon pieneneminen, hematokritiarvon pieneneminen, trombosytopenia, agranulosytoosi, luuydinlama, pansytopenia, lymfadenopatia, autoimmuunisairaudet

Umpieritys:

Tuntematon: antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö (SIADH)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:

Melko harvinainen: hypoglykemia (ks. kohta 4.4)

Psyykkiset häiriöt:

Yleinen: masennus

Melko harvinainen: sekavuus, hermostuneisuus, unettomuus

Harvinainen: poikkeavat unet, unihäiriöt

Hermosto:

Hyvin yleinen: heitehuimaus

Yleinen: päänsärky, pyörtyminen, makuhäiriöt

Melko harvinainen: uneliaisuus, parestesiat, kiertohuimaus

Silmät:

Hyvin yleinen: näön hämärtyminen

Kuulo ja tasapainoelin:

Melko harvinainen: tinnitus

Sydän:

Yleinen: rintakipu, rytmihäiriöt, angina pectoris, takykardia

Melko harvinainen: sydämentykytys, sydäninfarkti tai aivoverisuonitapahtuma*, mahdollisesti liiallisen hypotension takia suuren riskin potilailla (ks. kohta 4.4)

* Esiintyyvyystieys oli vastaava kuin lume- ja aktiivikontrolliryhmässä kliinisissä tutkimuksissa.

Verisuonisto:

Yleinen: hypotensio (myös ortostaattinen hypotensio)

Melko harvinainen: punoitus, ortostaattinen hypotensio

Harvinainen: Raynaud'n ilmiö

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina:

Hyvin yleinen: yskä

Yleinen: hengenahdistus

Melko harvinainen: voimakas nuha, kurkkukipu ja äänen käheys, bronkospasmi/astma

Harvinainen: keuhkoinfiltraatit, nuha, allerginen alveoliitti/eosinofiilinen keuhkokuume

Ruoansulatuselimistö:

Hyvin yleinen: pahoinvointi

Yleinen: ripuli, vatsakipu

Melko harvinainen: ileus, haimatulehdus, oksentelu, dyspepsia, ummetus, ruokahaluttomuus, mahalaukun ärsytys, suun kuivuus, peptinen haavauma

Harvinainen: stomatiitti/aftaiset haavaumat, glossiitti

Hyvin harvinainen: suoliston angioedeema

Maksaja sappi:

Harvinainen: maksan vajaatoiminta, maksatulehdus – joko hepatosellulaarinen tai kolestaattinen maksatulehdus, maksatulehdus, johon liittyy maksakuolio, kolestaasi (mukaan lukien ikterus)

Iho ja ihonalainen kudos:

Yleinen: ihottuma, yliherkkyys/angioneuroottinen edeema: kasvojen, raajojen, huulten, kielen, äänihuulten ja/tai kurkunpään angioneuroottista edeemaa on raportoitu (ks. kohta 4.4)

Melko harvinainen: likahikoilu, kutina, urtikaria, alopecia

Harvinainen: erythema multiforme, Stevens–Johnsonin oireyhtymä, eksfoliatiivinen dermatiitti, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, pemfigus, erytrodermia

On raportoitu oireyhdistelmää, johon voi kuulua joitakin tai kaikki seuraavista oireista: kuume, serosiitti, vaskuliitti, lihaskipu/lihastulehdus, nivelkipu/nivelituloehdus, positiiviset tumavasta-aineet, kohonnut lasko, eosinofilia ja leukosytoosi. Ihottumaa, valoyliherkkyyttä tai muita iho-oireita saattaa esiintyä.

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Melko harvinainen: lihaskrampit

Munuaiset ja virtsatiet:

Melko harvinainen: munuaisten toimintahäiriö, munuaisten vajaatoiminta, proteinuria

Harvinainen: oliguria

Sukupuolielimet ja rinnat:

Melko harvinainen: impotenssi

Harvinainen: gynecomastia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Hyvin yleinen: astenia

Yleinen: uupumus

Melko harvinainen: huonovointisuus, kuume

Tutkimukset:

Yleinen: hyperkalemia, seerumin kreatiiniipitoisuuden suureneminen

Melko harvinainen: veren ureapitoisuuden suureneminen, hyponatremia

Harvinainen: maksentsyymiарvojen suureneminen, seerumin bilirubiiniарvojen suureneminen

Pelkkä lerkaniidipiini

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilletulon jälkeen useimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat ääreisturvotos, päänsärky, punoitus, takykardia ja sydämentykytys.

Immuunijärjestelmä:

Harvinainen: yliherkkyyys

Hermosto:

Yleinen: päänsärky

Melko harvinainen: heitehuimaus

Harvinainen: uneliaisuus, pyörtyminen

Sydän:

Yleinen: takykardia, sydämentykytys

Harvinainen: angina pectoris

Verisuonisto:

Yleinen: punoitus

Melko harvinainen: hypotensio

Ruoansulatuselimistö:

Melko harvinainen: pahoinvointi, dyspepsia, ylävatsakipu

Harvinainen: oksentelu, ripuli

Tuntematon: ienten liikakasvu¹, samea peritoneaalidialyysisineste¹

Maksaja sappi:

Tuntematon: seerumin transaminaasiарvojen suureneminen¹

Iho ja ihonalainen kudos:

Melko harvinainen: ihottuma, kutina

Harvinainen: nokkosihottuma

Tuntematon: angioedeema¹

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Melko harvinainen: lihaskipu

Munuaiset ja virtsatiet:

Melko harvinainen: polyuria

Harvinainen: tiheävirtsaisuus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Yleinen: ääreisturvotus

Melko harvinainen: astenia, uupumus

Harvinainen: rintakipu

¹ Haittavaikutukset perustuvat maailmanlaajuisiin spontaaneihiin raportointitietoihin markkinoilletulon jälkeiseltä ajalta.

Jotkut dihydropyridiinit voivat harvoin aiheuttaa kipua sydänallassa tai angina pectorista. Hyvin harvoin angina pectorista sairastaville potilaille saattaa tulla kohtauksia useammin tai kohtaukset saattavat olla pidempikestoisia tai vaikeampia. Yksittäisiä sydäninfarktitapauksia saatetaan todeta. Lerkanidipiini ei näytä vaikuttavan verensokeriarvoihin tai seerumin rasva-arvoihin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Valmisten markkinoille tulon jälkeisessä käytössä on raportoitu muutamia tarkoituksellisia enalapriiliin/lerkanidipiinin (annokset 100 mg–1 000 mg kumpakin lääkeainetta) yliannostustapauksia, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa. Raportoidut oireet (systolisen verenpaineen aleneminen, bradykardia, levottomuus, uneliaisuus ja kylkikipu) ovat voineet johtua myös muiden lääkkeiden (esim. beetasalpaajien) samanaikaisesta käytöstä suurina annoksina.

Pelkän enalapriiliin tai lerkanidipiinin aiheuttamat yliannostusoireet:

Huomattavimmat tähän mennessä raportoitujen yliannostustapausten piirteet ovat merkittävä hypotensio (alkaa n. kuuden tunnin kuluttua tablettein ottamisen jälkeen) ja samanaikainen reniini-angiotensiinijärjestelmän salpaus sekä stupor. ACE:n estäjien yliannostukseen liittyviä oireita saattavat olla mm. verenkiertosokki, elektrolyyttihäiriöt, munuaisten vajaatoiminta, hyperventilaatio, takykardia, sydämentykytys, bradykardia, heitehuimaus, ahdistuneisuus ja yskä. Suun kautta otetun 300 mg:n enalapriiliannoksen jälkeen seerumissa on todettu 100-kertainen ja 440 mg:n enalapriiliannoksen jälkeen 200-kertainen enalapriilaattipitoisuus hoitoannosten jälkeisiin tavanomaisiin pitoisuksiin verrattuna.

Muiden dihydropyridiinien tavoin lerkanidipiinin yliannostus aiheuttaa voimakasta perifeeristä vasodilataatiota, voimakasta hypotensiota ja refleksitakykardiaa. Hyvin suuria annoksia käytettäessä ääreisselektiivisyys voi kuitenkin hävitä, mikä aiheuttaa bradykardian ja negatiivisen inotrooppisen vaikutuksen. Tavallisimpia yliannostustapauxiin liittyneitä haittavaikutuksia ovat olleet hypotensio, heitehuimaus, päänsärky ja sydämentykytys.

Pelkän enalapriiliin tai lerkanidipiinin aiheuttamien yliannostusoireiden hoito:

Enalapriiliin yliannostuksen suositeltu hoito on suolaliuoksen anto laskimoinfusiona. Jos hypotensiota ilmenee, potilas tulee asettaa sokkiasentoon. Hoitoa angiotensiini II -infusiolla ja/tai laskimoon annettavilla katekolamiineilla voidaan myös harkita, jos niitä on käytettävissä. Jos tabletit on otettu äskettäin, tulee pyrkiä poistamaan enalapriiliima leaatti elimistöstä (esim. oksennuttaminen, mahahuuhelu, absorboivien aineiden tai natriumsulfaatin antaminen). Enalapriilaatti voidaan poistaa verenkierrosta hemodialyysillä (ks. kohta 4.4). Tahdistinhoitoa tarvitaan, jos bradykardia ei reagoi hoitoon. Elintoimintoja, seerumin elektrolyttejä ja kreatiiniipitoisuutta on seurattava jatkuvasti.

Lerkanidipiiniyliannostuksen yhteydessä kliinisesti merkittävä hypotensio vaatii aktiivista kardiovaskulaarista tukea, kuten sydäntoiminnan ja hengityksen tiheää seurantaa, raajojen kohottamista ja kiertävän nestetilavuuden ja virtsanerityksen seurantaa. Koska lerkanidipiinin farmakologinen vaikutus säilyy pitkään, potilaan kardiovaskulaarista tilaa on välttämätöntä seurata vähintään 24 tuntia. Koska valmiste sitoutuu voimakkaasti proteiineihin, dialyysi ei todennäköisesti tehoa. Kun potilaalla odotetaan olevan keskivaikea tai vaikea myrkyystila, hänen tilaansa on seurattava tehovalvonnan yksikössä.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: ACE:n estääjät ja kalsiumkanavan salpaajat: enalapriili ja lerkanidipiini.

ATC-koodi: C09BB02

Zanipress on ACE:n estääjästä (enalapriili) ja kalsiumestääjästä (lerkanidipiini) muodostuva kiinteä yhdistelmävalmiste. Ne ovat verenpainetta alentavia yhdisteitä, joilla on toisiaan täydentävät vaikutusmekanismit essentiaalia hypertensiota sairastavien potilaiden verenpaineen hallintaan.

Enalapriili

Enalapriili leaatti on enalapriiliin maleaattisuola, kahden aminohappon (L-alaniinin ja L-proliinin) johdos. Angiotensiinikonvertaasientsyyti (ACE) on peptidyyli dipeptidaasi, joka katalysoi angiotensiini I:n konversiota vasopressori angiotensiini II:ksi. Imeytyksen jälkeen enalapriili hydrolysoituu enalapriilaaksi, joka estää angiotensiinikonvertaasia. ACE:n esto vähentää plasman angiotensiini II:a, minkä seurauksena plasman reniiniaktiivisuus lisääntyy (koska reniinin eritykseen kohdistuva negatiivinen palaute poistuu) ja aldosteronin eritys vähenee.

Koska ACE on sama kuin kininaasi II, enalapriili voi estää myös bradykiniinin, voimakkaan vasodepressoripeptidiin, hajoamista. Tämän mekanismin merkitystä enalapriiliin terapeutisen vaikutuksen kannalta ei kuitenkaan vielä ymmärretä.

Vaikka enalapriiliin verenpainetta alentava vaikutus johtuu pääasiassa reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän suppressiosta, enalapriili alentaa verenpainetta myös sellaisilla potilailla, joiden reniinitasot ovat alhaiset.

Enalapriiliin antaminen hypertensiiville potilaille alentaa verenpainetta sekä makuulla että istuma-asennossa ilman merkitsevää sykkeen kiihtymistä.

Symptomaattinen asentohypotensio on harvinaista. Joillakin potilailla saattaa kestää muutaman viikon ennen kuin verenpaine saadaan optimaalisesti hallintaan. Enalapriilihoidon äkilliseen lopettamiseen ei liity nopeaa verenpaineen kohoamista.

Tehokas ACE:n esto ilmenee tavallisesti 2–4 tuntia enalapriiliannoksen ottamisesta suun kautta. Verenpaine alkaa tavallisesti laskea tunnin kuluttua ja suurin lasku havaitaan 4–6 tuntia valmisteen ottamisen jälkeen. Vaikutuksen kesto riippuu annoksesta, mutta käytettäessä suositeltuja annoksia verenpainetta alentavien ja hemodynamiikan vaikutusten on osoitettu jatkuvan vähintään 24 tuntia.

Hemodynamiikkatutkimukset essentiaalia verenpainetautia sairastavilla potilailla osoittivat, että verenpaineen alenemiseen liittyy valtimoiden ääreisvastuksen väheneminen ja sydämen minuuttilavuuden suureneminen; sydämensyke muuttui vain vähän tai ei lainkaan. Enalapriiliin ottamisen jälkeen munuaisten verenvirtaus lisääntyi mutta glomerulusfiltraatio ei muuttunut. Natriumin tai veden kertymisestä elimistöön ei ollut merkkejä. Jos potilaan glomerulusfiltraatio ennen hoitoa oli alhainen, se kuitenkin yleensä parani.

Enalapriiliin ottamisen jälkeen albuminuria ja proteinuria (IgG:n ja kokonaisproteiini) vähenevät lyhyissä kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui diabeetikkaja ja ei-diabeetikkaja, joilla oli munuaissairaus.

Kahdessa suuressa satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] ja VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes]) tutkittiin ACE:n estäjän ja angiotensiini II -reseptorin salpaajan samanaikaista käyttöä.

ONTARGET-tutkimuksessa potilailla oli aiemmin ollut kardiovaskulaarisia tai serebrovaskulaarisia sairauksia tai tyypin 2 diabetes sekä esiintyi merkkejä kohde-elinvauriosta. VA NEPHRON-D -tutkimuksessa potilailla oli tyypin 2 diabetes ja diabeettinen nefropatia. Nämä tutkimukset eivät osoittaneet merkittävää suotuisaa vaikutusta renaalisiihin tai kardiovaskulaariisiin lopputapahtumiin ja kuolleisuuteen, mutta hyperkalemian, akuutin munuaisvaurion ja/tai hypotension riskin havaittiin kasvavan verrattuna monoterapiaan. Nämä tulokset soveltuvat myös muihin ACE:n estäjiin ja angiotensiini II -reseptorin salpaajiin, ottaen huomioon niiden samankaltaiset farmakodynaamiset ominaisuudet.

Sen vuoksi potilaiden, joilla on diabeettinen nefropatia, ei pidä käyttää ACE:n estäjiä ja angiotensiini II -reseptorin salpaajia samanaikaisesti.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) -tutkimuksessa testattiin saavutettavaa hyötyä aliskireenin lisäämisestä vakiohoitoon, jossa käytetään ACE:n estäjää tai angiotensiini II -reseptorin salpaajaa potilaille, joilla on sekä tyypin 2 diabetes että krooninen munuaissairaus, kardiovaskulaarinen sairaus, tai molemmat. Tutkimus päättiin aikaisin haittavaikustusten lisääntyneen riskin vuoksi. Kardiovaskulaariset kuolemat ja aivohalvaukset olivat lukumääräisesti yleisempää aliskireeniryhmässä kuin lumelääkeryhmässä ja haittavaikutuksia sekä vakavia haittavaikutuksia (hyperkalemia, hypotensio ja munuaisten vajaatoiminta) raportoitiin useammin aliskireeniryhmässä kuin lumelääkeryhmässä.

Lerkanidipiini

Lerkanidipiini on dihydropyridiiniryhmään kuuluva kalsiumestäjä, joka estää solukalvon läpi tapahtuvaa kalsiumin sisäänvirtausta sydänlihakseen ja sileään lihakseen. Se alentaa verenpainetta vaikuttamalla suoraan relaksiovasti verisuonten sileään lihakseen, jolloin perifeerinen kokonaishastus vähenee. Lyhyestä puoliintumisajasta huolimatta sen verenpainetta alentava vaiketus jatkuu pitkään, koska lerkanidipiinin jakautumiskerroin solukalvoille on suuri, eikä siihen liity negatiivista inotrooppista vaikutusta, sillä se on erittäin verisuoniselektiivinen.

Koska lerkanidipiinin aikaansaama vasodilataatio alkaa asteittain, akuuttia hypotensiota ja refleksitakykardiaa on havaittu verenpaineputilailla vain harvoin.

Kuten muillakin asymmetrisillä 1,4-dihydropyridiineillä, lerkanidipiinin verenpainetta laskeva vaiketus johtuu pääasiassa sen (S)-enantiomeeristä.

Enalapriili/ lerkanidipiini

Näiden aineiden yhdistelmällä on suurempi verenpaineen laskua voimistava vaiketus kuin kummallakaan komponentilla yksinään.

- Zanipress 10 mg/10 mg

Keskeisessä faasin III kaksoissokkoutetussa kliinisessä lisätutkimuksessa, johon osallistui 342 sellaista potilaasta, jotka eivät reagoineet riittävästi lerkanidipiinihoitoon annoksella 10 mg (istuma-asennossa mitattu diastolininen verenpaine (SDBP) 95–114 ja systolininen verenpaine (SSBP) 140–189 mmHg SSBP:n minimiarvo pieneni 5,4 mmHg enemmän yhdistelmähoidtoa (enalapriili 10 mg/lerkanidipiini 10 mg) saaneessa ryhmässä kuin pelkästään 10 mg lerkanidipiinia saaneessa ryhmässä 12 viikon kaksoissokkoutetun hoidon jälkeen (-7,7 mmHg vs. -2,3 mmHg, $p < 0,001$). Myös SDBP:n minimiarvo pieneni 2,8 mmHg enemmän yhdistelmähoidolla kuin monoterapialla (-7,1 mmHg vs. -4,3 mmHg, $p < 0,001$). Hoitoon reagoineiden osuus oli merkitsevästi suurempi

yhdistelmähoitoryhmässä kuin monoterapiaryhmässä: SSBP 41 % vs. 24 % ($p < 0,001$) ja SDBP 35 % vs. 24 % ($p = 0,032$). Merkitsevästi suuremmalla osalla yhdistelmähoitoryhmän potilaista SSBP (39 % vs. 22 %, $p < 0,001$) ja SDBP (29 % vs. 19 %, $p = 0,023$) normalisoituvat verrattuna monoterapiaryhmään. Tämän tutkimuksen pitkäkestoisessa avoimessa seurantavaiheessa oli mahdollista titrata yhdistelmähoidon annos tasolle enalapriili 20 mg/lerkanidipiini 10 mg, jos verenpaine pysyi tason 140/90 mmHg yläpuolella: annokset titrattiin 133 potilaalla 221 potilaasta ja SDBP normalisoitui titrauksen jälkeen kolmanneksella heistä.

- Zanipress 20 mg/10 mg

Keskeisessä faasin III kaksoissokkoutetussa kliinisessä lisätutkimuksessa, johon osallistui 327 sellaista potilasta, jotka eivät reagoineet riittävästi enalapriilihoitoon annoksella 20 mg (SDBP 95–114 ja SSBP 140–189 mmHg), 20 mg enalapriilia/10 mg lerkanidipiinia saaneilla potilailla SSBP:n (-9,8 vs. -6,7 mmHg, $p = 0,013$) ja SDBP:n (-9,2 vs. -7,5 mmHg, $p = 0,015$) minimiarvot alenivat merkitsevästi enemmän kuin monoterapiaa saaneilla. Hoitovasteen saavuttaneiden osuus ei ollut merkitsevästi suurempi yhdistelmähoitoryhmässä verrattuna monoterapiaryhmään (SDBP: 53 % vs. 43 %, $p = 0,076$; SSBP: 41 % vs. 33 %, $p = 0,116$). Osuuksista, joilla SDBP ja SSBP normalisoituvat (SDBP: 48 % vs. 37 %, $p = 0,055$, SSBP: 33 % vs. 28 %, $p = 0,325$) ei ollut merkitsevästi suurempi yhdistelmähoitoryhmässä verrattuna monoterapiaryhmään.

- Zanipress 20 mg/20 mg

Lume- ja aktiivikontrolloidussa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa faktoritutkimuksessa tarkasteltiin 1 039 potilasta, joilla oli kohtalaisesti kohonnut verenpaine (vastaanotolla mitattu SDBP 100–109 mmHg, SSBP < 180 mmHg ja kotona mitattu diastolininen verenpaine ≥ 85 mmHg). Niillä potilailla, jotka saivat 20 mg enalapriilia/20 mg lerkanidipiinia, vastaanotolla ja kotona mitatut SDBP ja SSBP alenivat merkitsevästi enemmän kuin lumelääkettä saaneilla ($P < 0,001$). Kliinisesti merkittäviä eroja muutoksessa vastaanotolla mitatusta SDBP:n lähtötilanteen minimiarvosta havaittiin yhdistelmähoidon (20 mg/20 mg; -15,2 mmHg, $n = 113$) ja pelkän enalapriilihoidon (20 mg; -11,3 mmHg, $P = 0,004$, $n = 113$) tai pelkän lerkanidipiinihoidon (20 mg; -13,0 mmHg, $P = 0,092$, $n = 113$) välillä. Vastaavasti kliinisesti merkittäviä eroja muutoksessa vastaanotolla mitatusta SSBP:n lähtötilanteen minimiarvosta havaittiin yhdistelmähoidon (20 mg/20 mg; -19,2 mmHg) ja pelkän lerkanidipiinihoidon (20 mg; -13,0 mmHg, $P = 0,002$) tai pelkän enalapriilihoidon (20 mg; -15,3 mmHg, $P = 0,055$) välillä. Kliinisesti merkittäviä eroja havaittiin myös kotona mitatuissa systolisessa ja diastolisessa verenpaineessa. Hoitoon reagoineiden osuus oli merkitsevästi suurempi yhdistelmähoitoryhmässä (20 mg/20 mg; SDBP 75 %, SSBP 71 %) kuin lumeryhmässä ($P < 0,01$) ja kummassakin monoterapiaryhmässä ($P < 0,01$). Verenpaine normalisoitui suuremmalla osalla yhdistelmähoitoa saaneista (42 %) kuin lumelääkettä saaneista (22 %).

5.2 Farmakokinetiikka

Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei ole havaittu enalapriiliin ja lerkanidipiinin yhteiskäytön aikana.

Enalapriiliin farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu enalapriili imetyy nopeasti, ja huippupitoisuus seerumissa saavutetaan tunnin sisällä. Virtsasta mitattujen pitoisuksien perusteella suun kautta enalapriilimaalaatin muodossa otettu enalapriili imetyyy noin 60-prosenttisesti. Ruuansulatuskanavassa oleva ruoka ei vaikuta suun kautta otetun enalapriilin imetyymiseen.

Jakautuminen

Imetytymisen jälkeen suun kautta otettu enalapriili hydrolysoituu nopeasti ja laajamittaisesti enalapriilaatiksi, joka on voimakas angiotensiinikonvertaasin estäjä. Enalapriilaatin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan noin 4 tuntia suun kautta otetun enalapriilimaalaattianoksen jälkeen. Peroraalisen enalapriilin toistuvassa annostelussa enalapriilaatin efektiivinen kumulatiivinen puoliintumisaika on 11 tuntia. Henkilöillä, joiden munuaiset toimivat normaalisti, seerumin vakaan tilan enalapriilipitoisuudet saavutettiin 4 hoitopäivän jälkeen.

Terapeutisesti merkityksellisillä pitoisuksilla enalapriili sitoutuu plasman proteiineihin korkeintaan 60-prosenttisesti.

Biotransformaatio

Enalapriaatiksi muuttumisen lisäksi enalapriililla ei ole havaittu muuta merkittävää metabolismaa.

Eliminaatio

Enalapriaatti eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta. Pääasialliset aineosat virtsassa ovat enalapriaatti, jota on noin 40 % annoksesta, ja muutumaton enalapriili (noin 20 %).

Munuaisten vajaatoiminta

Enalapriili- ja enalapriaattialtistus on suurentunut munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Jos potilaalla oli lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiiniipuhdistuma 40–60 ml/min), enalapriaatin vakaan tilan AUC oli noin kaksi kertaa suurempi kuin potilailla, joiden munuaisten toiminta oli normaalista, kun heille oli annettu 5 mg kerran vuorokaudessa. Vaikean munuaisten vajaatoiminnan (kreatiiniipuhdistuma \leq 30 ml/min) yhteydessä AUC suurenii noin 8-kertaiseksi. Toistuvien enalapriilimaistaannosten ottamisen jälkeen enalapriaatin tehokas puoliintumisaika pitenee tämänasteisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja vakaan tilan saavuttamiseen kuluva aika pitenee (ks. kohta 4.2). Enalapriaatti voidaan poistaa yleisestä verenkierrosta hemodialyysillä. Dialysisin puhdistuma on 62 ml/min.

Imetyys

Kun viidelle synnyttäneelle naiselle annettiin 20 mg kerta-annos suun kautta, keskimääräinen enalapriilin huippupitoisuus rintamaidossa oli 1,7 mikrog/l (vaihteluväli 0,54–5,9 mikrog/l) 4–6 tuntia annoksen ottamisen jälkeen. Keskimääräinen enalapriaatin huippupitoisuus oli 1,7 mikrog/l (vaihteluväli 1,2–2,3 mikrog/l) ja se ilmeni eri aikoina 24 tunnin aikana. Enalapriilin huippupitoisuuskseen mukaan arvioitu rintamaidossa oleva maksimimäärä, jonka pelkästään rintamaitoa ravinnoksi saava lapsi saa, on noin 0,16 % äidin painoon suhteutetusta annoksesta. Enalapriilia 10 mg vuorokaudessa suun kautta 11 kuukauden ajan käytäneen naisen enalapriilin huippupitoisuus rintamaidossa oli 2 mikrog/l 4 tuntia annoksen ottamisen jälkeen ja enalapriaatin huippupitoisuus oli 0,75 mikrog/l noin 9 tuntia annoksen ottamisen jälkeen. Enalapriilin kokonaismäärä mitattuna rintamaidosta 24 tunnin kuluessa oli 1,44 mikrog/l ja enalapriaatin 0,63 mikrog/l. Enalapriaatin pitoisuudet rintamaidossa olivat mittaanmattomissa ($<0,2$ mikrog/l) 4 tunnin kuluttua 5 mg kerta-annoksen ottamisen jälkeen yhdellä naisella ja 10 mg kerta-annoksen ottamisen jälkeen kahdella naisella; enalapriilipitoisuusia ei määritetty.

Lerkanidipiinin farmakokinetiikka

Imetyminen

Suun kautta otettu lerkanidipiini imetyyy täydellisesti ja huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 1,5–3 tunnissa.

Lerkanidipiinin kahdella enantiomeerilla on samanlainen plasman pitoisuuden profiili: huippupitoisuuden saavuttamiseen plasmassa kuluu sama aika ja huippupitoisuus plasmassa ja AUC ovat keskimäärin 1,2 kertaa suuremmat (S)-enantiomeerillä. Kahden enantiomeerin eliminaation puoliintumisajat ovat käytännössä samat. Kahden enantiomeerin interkonversioita ei ole havaittu ”*in vivo*”.

Runsaan ensikierron metabolian takia suun kautta otetun lerkanidipiinin absoluuttinen hyötyosuus ei-paasto-olosuhteissa on noin 10 %. Biologinen hyötyosuus pienenee kuitenkin kolmannekseen, kun terveet vapaaehtoiset ottavat valmistetta paasto-olosuhteissa.

Suun kautta otetun lerkanidipiinin hyötyosuus suurenee 4-kertaiseksi kun se otetaan 2 tuntia runsaasti rasvaa sisältävän aterian jälkeen. Näin ollen lääke tulisi ottaa ennen ateriaa.

Jakautuminen

Jakautuminen plasmasta kudoksiin ja elimiin on nopeaa ja laajamittaista.

Lerkanidipiini sitoutuu plasman proteiiniiin yli 98-prosenttisesti. Koska plasman proteiinitasot ovat alempia vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, lääkkeen vapaa osuus saattaa olla suurempi.

Biotransformaatio

Lerkanidipiini metaboloituu suureksi osaksi CYP3A4:n avulla; kanta-ainetta ei löydy virtsasta eikä ulosteesta. Se muuttuu pääasiassa inaktiivisiksi metaboliiteiksi ja noin 50 % annoksesta erittyy virtsaan.

In vitro -kokeissa, joissa on käytetty ihmisen maksan mikrosomeja, on osoitettu, että lerkanidipiini estää vähän CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymejä pitoisuksilla, jotka ovat 160 ja 40 kertaa suurempia kuin 20 mg:n annoksen jälkeen saavutettavat plasman huippupitoisuudet.

Lisäksi ihmisillä tehdynässä yhteisvaikutustutkimuksissa on osoitettu, että lerkanidipiini ei muuta plasman midatsolaami- tai metoprololitasoja. Midatsolaami on tyypillinen CYP3A4:n substraatti ja metoprololi tyypillinen CYP2D6:n substraatti. Siksi ei ole odotettavissa, että terapeutisia annoksia käytettäessä lerkanidipiini estäisi CYP3A4:n- ja CYP2D6:n kautta metaboloituvien lääkkeiden biotransformaatiota.

Eliminaatio

Eliminaatio tapahtuu pääasiassa biotransformaation kautta.

Keskimääräiseksi terminaaliseksi eliminaation puoliintumisajaksi laskettiin 8–10 tuntia, ja koska lääke sitoutuu vahvasti lipidkalvoihin, terapeutinen vaiketus kestää 24 tuntia. Toistuvaisannosten yhteydessä ei havaittu kertymistä elimistöön.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Lerkanidipiinin käyttö suun kautta saa aikaan sellaiset pitoisuudet plasmassa, jotka eivät ole suorassa suhteessa annokseen (epälineaarinen kinetiikka). 10, 20 ja 40 mg:n annosten jälkeen pitoisuudet plasmassa olivat suhteessa 1:3:8 ja plasman AUC-arvot suhteessa 1:4:18, mikä viittaa ensikierron metabolismin progressiiviseen saturoitumiseen. Tämän perusteella hyötyosuus kasvaa annosta suurennettaessa.

Eriityisryhmät

On osoitettu, että lerkanidipiinin farmakokinetiikka on jäkkäiden potilaiden ja lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa tai lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden elimistössä samanlaista kuin potilasväestössä yleensä. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavissa tai dialysisihoidosta riippuvaisissa potilaissa lääkeaineen pitoisuudet olivat suurempia (noin 70 %). Kohtalaista tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavissa lerkanidipiinin systeeminen hyötyosuus on todennäköisesti suurempi, koska lääkeaine metaboloituu yleensä laajamittaisesti maksan kautta.

5.3 Prekliinis et tiedot turvallis uudesta

Enalapriiliin ja lerkanidipiinin yhdistelmä

Enalapriiliin ja lerkanidipiinin kiinteän yhdistelman mahdollista toksisuutta tutkittiin rotilla 3 kuukautta kestäneen oraalisen käytön jälkeen sekä kahdessa genotoksisuustestissä. Yhdistelman toksikologinen profiili ei eronnut yksittäisten komponenttien profileista.

Seuraavat tiedot ovat olemassa eri komponenteista, enalapriilista ja lerkanidipiinista.

Enalapriili

Farmakologista turvallisutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmille. Lisääntymistoksisuustutkimusten perusteella enalapriililla ei ole vaikutusta hedelmällisyteen ja lisääntymiskykyyn rotilla, eikä aine ole teratogeninen. Tutkimuksessa, jossa naarasrotille annettiin läkettä ennen parittelua ja raskauden aikana, rotanpoikasten kuolemat

lisääntyivät imetysaikana. Valmiste läpäisee istukan ja läkettää erittyi maitoon. ACE:n estäjien, lääkeryhmänä, on osoitettu aiheuttavan haittavaikutuksia sikiön kehityksen loppuvaiheessa. Seurausena on ollut sikiökuolemia ja synnynnäisiä vaiktuksia, erityisesti kallossa. Sikiötoksisuutta, kohdunsiäisen kasvun hidastumista ja avoimia valtimotiehyitä on myös raportoitu. Näiden kehityspoikkeavuuksien uskotaan johtuvan osaksi ACE:n estäjien suorasta vaikutuksesta sikiön reniini-angiotensiinijärjestelmään ja osaksi iskemiasta, joka aiheutuu äidin hypotensiosta ja sikiön ja istukan välichen verenvirtauksen ja hapen ja ravintoaineiden kulun vähentämisestä.

Lerkanidipiini

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeneenisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisen pitkäkestoisissa, rotilla ja koirilla tehdyissä tutkimuksissa havaitut vaikutukset johtuvat, suoraan tai epäsuorasti, suurten kalsiumestäjäannosten tunnetuista vaikutuksista; ne heijastavat pääasiassa liallista farmakodynamista vaikutusta.

Lerkanidipiinihoito ei vaikuttanut hedelmällisyteen tai yleiseen lisääntymiskykyyn rotilla mutta suuret annokset aiheuttivat alkioiden menetyksiä (ennen ja jälkeen kiinnityksen) ja viivästyttivät sikiön kehitystä. Rotilla ja kaneilla ei havaittu teratogenisia vaiktuksia mutta muiden dihydropyridiinien on havaittu olevan teratogenisia eläimillä. Kun suuria annoksia (12 mg/kg/vrk) lerkanidipiiniä annettiin synnytyksen aikana, aiheutui synnytyshäiriötä.

Lerkanidipiinin ja/tai sen metaboliittien jakautumista tiimeissä eläimissä ja niiden eritymistä rintamaitoon ei ole tutkittu.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Ydin:

Laktoosimonohydraatti
Mikrokiteinen selluloosa
Natriumtärkkelysglykolaatti tyyppi A
Povidoni K30
Natriumvetykarbonaatti
Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi 5 cP
Titaanidioksiidi (E171)
Talkki
Makrogoli 6000

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

6.3 Kestoaika

2 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. Säilytä alle 25 °C.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Polyamidi-alumiini-PVC/alumiiniläpipainopakkaus
7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98 ja 100 tabletin pakkaukset.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Recordati Ireland Limited
Raheens East
Ringaskiddy
Co. Cork
Irlanti

8. MYYNTILUVAN NUMERO

24244

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

24.7.2008

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

31.01.2022

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zanipress 10 mg/10 mg filmdragerade tablettter

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg enalaprilmaleat (motsvarande 7,64 mg enalapril) och 10 mg lerkanidipinhydroklorid (motsvarande 9,44 mg lerkanidipin)

Hjälpämne med känd effekt: varje tablett innehåller 102,0 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vit, bikonvex, rund tablett med en diameter på 8,5 mm.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni hos patienter som inte uppnår tillräcklig kontroll av blodtrycket vid behandling med endast lerkanidipin 10 mg.

Den fasta kombinationen Zanipress 10 mg/10 mg ska inte användas vid initial behandling av hypertoni.

4.2 Dosering och administreringssätt

Patienter vars blodtryck inte kan kontrolleras tillfredställande med endast lerkanidipin 10 mg kan antingen titreras upp till monoterapi med lerkanidipin 20 mg eller byta till kombinationstablett Zanipress 10 mg/10 mg.

Individuell dositrering med de aktiva substanserna kan rekommenderas. I de fall, där det är kliniskt lämpligt, kan patienten byta direkt från monoterapi till den fasta kombinationen.

Dosering

Rekommenderad dos är en tablett, en gång om dagen, minst 15 minuter före måltid.

Äldre:

Dosen ska anpassas efter patientens njurfunktion (se ”Nedsatt njurfunktion”).

Nedsatt njurfunktion:

Zanipress är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance <30 ml/min) och hos patienter som genomgår hemodialys (se avsnitt 4.3 och 4.4). Särskild försiktighet ska iakttagas när behandling påbörjas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion:

Zanipress är kontraindicerat till patienter med gravt nedsatt leverfunktion. Särskild

försiktighet ska iakttagas när behandling påbörjas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population:

Det finns ingen relevant användning av Zanipress för en pediatrisk population för indikationen hypertoni.

Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet:

- Behandlingen ska helst tas på morgonen minst 15 minuter före frukost.
- Denna produkt ska inte tas med grapefruktjuice (se avsnitt 4.3 och 4.5).

4.3 Kontraindikationer

- Överkänslighet mot andra ACE-hämmare eller andra dihydropyridinderiverade kalciumkanalblockerare eller mot något hjälpméne som anges i avsnitt 6.1.
- Tidigare angioödem i samband med behandling med ACE-hämmare.
- Ärftligt eller idiopatiskt angioödem.
- Graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.4 och 4.6).
- Reducerat blodflöde från vänster hjärtklaff.
- Obehandlad kongestiv hjärtsvikt.
- Instabil angina pectoris eller hjärtinfarkt under senaste månaden.
- Gravt nedsatt leverfunktion.
- Gravt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance <30 ml/min), inklusive patienter som genomgår hemodialys.
- Samtidigt intag av:
 - starka CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.5)
 - ciklosporin (se avsnitt 4.5)
 - grapefrukt eller grapefruktjuice (se avsnitt 4.5).
- Samtidig användning med en kombinationsprodukt som innehåller sakubitril och valsartan. Enalapril får inte sättas in tidigare än 36 timmar efter den sista dosen av sakubitril och valsartan (se även avsnitt 4.4 och 4.5).

Samtidig användning av Zanipress och produkter som innehåller aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m²) (se avsnitt 4.5 och 5.1).

4.4 Varningar och försiktighet

Symtomatisk hypotoni

Symtomatisk hypotoni ses sällan vid okomplicerad hypertoni. Hos hypertensiva patienter som behandles med enalapril är det mer troligt att symptomatisk hypotoni uppkommer om patienten är uttorkad t.ex. av diuretikabehandling, saltfattig kost, dialys, diarré eller kräkningar (se avsnitt 4.5). Symtomatisk hypotoni har observerats hos patienter med hjärtfel – med eller utan associerad njurinsufficiens. Det är mest troligt att detta inträffar hos patienter med allvarligt hjärtfel, som på grund av sin sjukdom behandlas med loopdiureтика eller uppvisar hyponatremi eller nedsatt njurfunktion. Behandling av dessa patienter ska initieras under överinsyn av läkare och därefter monitoreras vid dosjustering av enalapril och/eller diuretika. Detsamma gäller för patienter med ischemisk hjärtsjukdom eller cerebrovaskulära sjukdomar, där ett kraftigt blodtrycksfall kan leda till hjärtinfarkt eller cerebrovaskulär incident. Om patienten drabbas av blodtrycksfall, ska denna placeras i liggande ställning och om nödvändigt ges en intravenös infusion av fysiologisk saltlösning. Ett övergående hypotensivt

svar är inte en kontraindikation för fortsatt behandling, den kan vanligtvis fortsätta utan komplikationer så snart som blodtrycket normaliseras efter volymökning. Hos vissa patienter med hjärtfel som har normalt eller lågt blodtryck, kan ytterligare sänkning av blodtrycket inträffa med enalapril. Denna effekt är förväntad och vanligtvis inte ett skäl att avbryta behandlingen. Om hypotonin blir symptomatisk, kan det vara nödvändigt att sänka dosen och/eller sätta ut diureтика och/eller enalapril.

Sick-sinussyndrom

Försiktighet ska iakttas vid användning av lerkanidipin hos patienter med sick-sinussyndrom (utan pacemaker).

Vänsterkammardysfunktion

Även om kontrollerade hemodynamiska studier inte har visat försämring av kammarfunktionen ska patienter med vänsterkammardysfunktion behandlas med försiktighet.

Ischemisk hjärtsjukdom

Vissa kortverkande dihydropyridinderivat kan eventuellt vara förenade med ökad kardiovaskulär risk hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Även om lerkanidipin är långtidsverkande ska försiktighet iakttas vid behandling av dessa patienter. Vissa dihydropyridinderivat kan i sällsynta fall orsaka prekordial smärta eller angina pectoris. I mycket sällsynta fall kan patienter som redan lider av angina pectoris drabbas av tätare, svårare eller mer långdragna attacker. Enstaka fall av hjärtinfarkt kan observeras (se avsnitt 4.8).

Nedsatt njurfunktion

Särskild försiktighet ska iakttas när behandling initieras hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rutinmässig kontroll av kalium- och kreatininhalten i serum är en del av den normala medicinska behandlingen av dessa patienter.

Njursvikt har rapporterats i samband med enalapril och har huvudsakligen förekommit hos patienter med allvarlig hjärvsvikt eller underliggande njursjukdom, inklusive njurarterstenos. Om den upptäcks snabbt och behandlas korrekt, är njursvikt i samband med enalaprilbehandling vanligtvis reversibel.

Vissa hypertensiva patienter utan uppenbar tidigare njursjukdom har utvecklat ökade nivåer av urea och kreatinin i blodet när enalapril har givits samtidigt med ett diuretikum. Det kan då vara nödvändigt att reducera dosen enalapril och/eller sätta ut diuretikumet. Eventuell förekomst av underliggande njurarterstenos ska beaktas (se avsnitt 4.4, Renovaskulär hypertoni).

Renovaskulär hypertoni

Risken för hypotoni och njurinsufficiens är förhöjd då patienter med bilateral njurarterstenos eller stenos i en artär till en ensam fungerande njure behandlas med ACE-hämmare.

Försämrad njurfunktion kan förekomma vid endast små förändringar av serumkreatinin. Hos dessa patienter ska behandlingen inledas under noggrann medicinsk övervakning, med låga doser, försiktig titrering och övervakning av njurfunktionen.

Njurtransplantation

Det saknas erfarenhet vad gäller användning av lerkanidipin eller enalapril hos patienter som nyligen genomgått njurtransplantation. Behandling med Zanipress rekommenderas därför inte.

Leversvikt

Den blodtryckssänkande effekten av lerkanidipin kan potentieras hos patienter med

leverdysfunktion.

I sällsynta fall har ACE-hämmare associerats med ett syndrom som inleds med kolestatisk gulsort eller hepatit och utvecklas till fulminant hepatisk nekros, i vissa fall med dödlig utgång. Mekanismen bakom detta syndrom är inte känd. Patienter som under behandling med ACE-hämmare utvecklar gulsort eller påtagligt förhöjda leverenzymer ska avsluta behandlingen och få lämplig medicinsk uppföljning.

Peritonealdialys

Lerkanidipin har associerats med utveckling av grumlig peritonealvätska hos patienter som behandlas med peritonealdialys. Grumligheten beror på ökad koncentration av triglycerider i peritonealvätskan. Mekanismen är inte känd men grumligheten tenderar att försvinna inom kort efter utsättning av lerkanidipin. Det är viktigt att känna till detta samband eftersom grumlig peritonealvätska kan misstas för infektös peritonit, vilket kan leda till onödig inläggning på sjukhus och empirisk antibiotikabehandling.

Neutropeni/agranulocytos

Neutropeni/agranulocytos, trombocytopeni och anemi har rapporterats hos patienter som behandlas med ACE-hämmare. Hos patienter med normal njurfunktion och som saknar andra komplicerande faktorer uppkommer sällan neutropeni. Extrem försiktighet ska iakttagas vid enalaprilbehandling hos patienter med kollagen vaskulär kärlsjukdom, immunosuppressiv behandling, behandling med allopurinol eller prokainamid eller en kombination av dessa komplicerande faktorer, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Vissa av dessa patienter utvecklade allvarliga infektioner som i några fall inte svarade på intensiv antibiotikabehandling. Om sådana patienter behandlas med enalapril, ska vita blodkroppar kontrolleras regelbundet och patienten ska uppmanas att rapportera alla eventuella tecken på infektion.

Överkänslighet/angioneurotiskt ödem

Angioneurotiskt ödem i ansikte, extremiteter, läppar, tunga, stämband och/eller struphuvud har rapporterats hos patienter som behandlas med ACE-hämmare, inklusive enalapril. Detta kan uppkomma när som helst under behandlingen. Om detta inträffar ska behandlingen avbrytas omedelbart och lämplig övervakning inledas för att säkerställa fullständig tillbakagång av symptomen innan patienten skrivs ut. Även i de fall där svullnaden är begränsad till tungan, utan andningssvårigheter, kan långvarig observation vara nödvändig eftersom behandling med antihistaminer och kortikosteroider kanske inte är tillräcklig.

I mycket sällsynta fall har dödsfall rapporterats på grund av angioödem som påverkar struphuvudet eller tungan. Patienter med ödem i tungan, stämbanden eller struphuvudet kommer sannolikt att uppleva andningsproblem, speciellt de som genomgått luftvägskirurgi. När tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkats finns risk för luftvägsobstruktion, och lämplig behandling ska omedelbart sättas in, t.ex. subkutan administrering av adrenalinlösning 1:1000 (0,3 till 0,5 ml) och/eller andra åtgärder för att säkerställa fria luftvägar hos patienten.

Svarta patienter som får ACE-hämmare har rapporterats ha en högre incidens av angioödem jämfört med icke-svarta.

Patienter som tidigare drabbats av angioödem utan samband med behandling med ACE-hämmare, kan löpa ökad risk för angioödem vid användning av ACE-hämmare (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning av ACE-hämmare med sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade risken för angioödem. Behandling med sakubitril/valsartan får inte påbörjas tidigare än 36 timmar efter den sista dosen enalapril. Behandling med enalapril får inte påbörjas tidigare än 36 timmar efter den sista dosen sakubitril/valsartan (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin kan leda till ökad risk för angioödem (t.ex. svullnad i luftvägar eller tunga, med eller utan andningssvårigheter) (se avsnitt 4.5). Försiktighet ska iakttas vid insättning av racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin hos patienter som redan tar en ACE-hämmare.

Anafylaktoida reaktioner under hyposensibilisering mot insektsbett

I sällsynta fall har patienter som får ACE-hämmare vid hyposensibilisering med geting- eller bigift upplevt livshotande anafylaktoida reaktioner. Dessa reaktioner kan förebyggas genom att behandlingen med ACE-hämmare sätts ut tillfälligt före varje hyposensibilisering.

Anafylaktoida reaktioner vid LDL-aferes

I sällsynta fall har patienter som får ACE-hämmare under LDL-aferes (lipoproteiner med låg densitet) med dextransulfat upplevt livshotande anafylaktoida reaktioner. Dessa reaktioner förebyggdes genom att behandlingen med ACE-hämmare sattes ut tillfälligt före varje aferes.

Hypoglykemi

Patienter med diabetes som behandlas med perorala antidiabetika eller insulin som påbörjar en behandling med ACE-hämmare, ska uppmanas att vara vaksamma för hypoglykemi, speciellt under den första månaden med samtidig användning (se avsnitt 4.5).

Hosta

Hosta har rapporterats vid användning av ACE-hämmare. Hostan är icke-produktiv, ihållande och upphör efter att behandlingen avbrutits. Hosta orsakad av ACE-hämmare ska beaktas som en tänkbar differentialdiagnos vid hosta.

Kirurgi/anestesi

Hos patienter som genomgår större operationer eller ges anestesi med medel som framkallar hypotoni, blockerar enalapril bildningen av angiotensin II sekundärt till kompensatorisk reninfrisättning. Om hypotoni inträffar och anses vara en följd av detta, kan det åtgärdas med volymexpansion.

Serumkalium

ACE-hämmare kan orsaka hyperkalemi eftersom de hämmar frisättningen av aldosteron. Effekten är vanligen inte av betydelse hos patienter med normal njurfunktion. Hyperkalemi kan emellertid förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion och/eller patienter som tar kaliumsupplement (inklusive saltersättningsmedel), kaliumsparande diureтика, trimetoprim eller kotrimoxazol (dvs. kombination av trimetoprim och sulfametoxyzol) och i synnerhet aldosteronantagonister eller angiotensinreceptorblockerare. Kaliumsparande diureтика och angiotensinreceptorblockerare ska användas med försiktighet hos patienter som får ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion ska övervakas (se avsnitt 4.5).

Litium

Kombinationen av litium och enalapril rekommenderas generellt inte (se avsnitt 4.5).

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt). Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion, elektrolyter och blodtryck.
ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare ska inte användas samtidigt till patienter med diabetesnephropati.

CYP3A4-inducerare

Läkemedel som inducerar CYP3A4 såsom antiepileptika (t.ex. fenytoin, karbamazepin) och rifampicin kan reducera plasmanivåerna av lerkandipin och effekten av läkemedlet kan då bli mindre än förväntat (se avsnitt 4.5).

Etniska skillnader

Liksom andra ACE-hämmare sänker inte enalapril blodtrycket lika effektivt hos svarta patienter som hos icke-svarta, troligtvis beroende på att nivån plasmarenin ofta är lägre hos den svarta, hypertensiva populationen.

Graviditet

Zanipress rekommenderas inte under graviditet.

Behandling med ACE-hämmare, som enalapril, ska inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt behandling anses nödvändig, ska patienter som planerar bli gravida byta till en alternativ antihypertensiv behandling som har en etablerad, säker profil för användning under graviditet. När graviditet upptäcks, ska behandling med ACE-hämmare upphöra omedelbart och om möjligt ska en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Användning av lerkandipin rekommenderas inte heller under graviditet eller för kvinnor kan bli gravida (se avsnitt 4.6).

Amning

Behandling med Zanipress rekommenderas inte under amning (se avsnitt 4.6).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts hos barn.

Alkohol

Alkohol kan förstärka effekten av vasodilaterande, antihypertensiva läkemedel och ska därför undvikas (se avsnitt 4.5).

Laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda Zanipress: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Den blodtryckssänkande effekten av Zanipress kan potentieras av andra blodtryckssänkande läkemedel såsom diureтика, beta-blockerare, alfa-blockerare och andra substanser.

Dessutom har följande interaktioner observerats med någon av de ingående substanserna i kombinationsprodukten.

Enalaprilmaleat

Läkemedel som ökar risken för angioödem

Samtidig användning av ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade risken för angioödem (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och racecadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin kan leda till ökad risk för angioödem (se avsnitt 4.5).

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Kaliumsparande diureтика, kaliumsupplement eller kaliuminnehållande saltersättning

Även om serumkalium vanligen ligger kvar inom normala gränser, kan hyperkalemi förekomma hos vissa patienter som behandlas med enalapril. Kaliumsparande diureтика (t.ex. spironolakton, triamteren eller amilorid), kaliumsupplement eller kaliuminnehållande saltersättningsmedel kan leda till en signifikant höjning av serumkalium. Försiktighet ska även iakttagas när enalapril ges samtidigt med andra substanser som höjer serumkalium, såsom trimetoprim och kotrimoxazol (kombination av trimetoprim och sulfametoxyzol) eftersom man vet att trimetoprim verkar som ett kaliumsparande diuretikum, såsom amilorid. Kombinationen av enalapril med ovan nämnda läkemedel rekommenderas därför inte. Om samtidig användning är indicerad, ska de användas med försiktighet och serumkalium ska kontrolleras med tät mellanrum.

Ciklosporin

Hyperkalemi kan förekomma vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciklosporin. Övervakning av serumkalium rekommenderas.

Heparin

Hyperkalemi kan förekomma vid samtidig användning av ACE-hämmare och heparin. Övervakning av serumkalium rekommenderas.

Diureтика (tiazider eller loopdiureтика)

Tidigare behandling med diureтика i höga doser kan orsaka vätskebrist och leda till ökad risk för hypotoni när behandling med enalapril inleds (se avsnitt 4.4). De hypotensiva effekterna kan reduceras genom att diuretikabehandlingen avbryts, genom ökad volym eller ökat saltintag, eller genom att enalaprilbehandlingen inleds med låga doser.

Andra blodtryckssänkande läkemedel

Samtidig användning av andra blodtryckssänkande läkemedel kan förstärka de hypotensiva effekterna av enalapril. Samtidig användning av nitroglycerin och andra nitrater, eller andra vasodilaterare, kan sänka blodtrycket ytterligare.

Litium

Reversibla ökningar av serumlitiumkoncentrationer och toxicitet har rapporterats vid samtidig användning av litium och ACE-hämmare. Samtidig användning av tiaziddiureтика kan öka litiumnivåerna och öka risken för litiumtoxicitet vid samtidig användning med ACE-hämmare. Användning av enalapril tillsammans med litium rekommenderas inte, men om det ändå visar sig vara nödvändigt, måste serumlitiumnivån övervakas noga (se avsnitt 4.4).

Tricykliska antidepressiva/antipsykotika/anestetika/narkotika

Samtidig användning av ACE-hämmare med vissa anestetika, tricykliska antidepressiva och antipsykotika kan orsaka ytterligare blodtryckssänkning (se avsnitt 4.4).

Icke-steroidea antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive selektiva cyklooxygenas-2-(COX-2)-hämmare

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), inklusive selektiva cyclooxygenas-2-hämmare (COX-2-hämmare), kan minska effekten av diureтика och andra blodtryckssänkande läkemedel. Därför kan NSAID-preparat, inklusive selektiva COX-2-hämmare, minska den antihypertensiva effekten av angiotensin II-receptorblockerare eller ACE-hämmare.

Samtidig administrering av NSAID (inklusive COX-2-hämmare) och angiotensin II-receptorblockerare eller ACE-hämmare utövar en additiv effekt på ökningen av serumkalium och kan resultera i en försämring av njurfunktionen. Dessa effekter är vanligtvis reversibla. I sällsynta fall kan akut njursvikt förekomma, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion (såsom äldre eller patienter med minskad blodvolym, inklusive de med diuretikabehandling). Därför ska kombinationen ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion. Patienterna ska vara adekvat hydrerade, och kontroll av njurfunktionen ska övervägas efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Guld

Sällsynta fall av nitrito-ida reaktioner (symtom inkluderande ansiktsrodnad, illamående, kräkningar och hypoton) har rapporterats hos patienter som behandles med injicerbart guld (natriumaurotiomatal) och samtidigt behandles med ACE-hämmare, inklusive enalapril.

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan reducera den antihypertensiva effekten av ACE-hämmare.

Antidiabetika

Epidemiologiska studier antyder att samtidig administrering av ACE-hämmare och antidiabetika (insulin eller perorala hypoglykemiska medel) kan ge en ökad blodglukosssänkande effekt och därmed risk för hypoglykemi. Sannolikheten för detta fenomen tycktes vara större under de första veckorna med kombinationsbehandling och hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Alkohol

Alkohol förstärker den hypotensiva effekten av ACE-hämmare.

Acetylsalicylsyra, trombolytika and β-blockerare

Enalapril kan administreras säkert samtidigt som acetylsalicylsyra (vid kardiologiska doser), trombolytika och β-blockerare.

Lerkanidipin

Samtidig användning är kontraindicerad

CYP3A4-hämmare

Då lerknidipin metaboliseras via enzymet CYP3A4, kan samtidig administrering av substanser som hämmar eller inducerar CYP3A4 interagera med metabolism och eliminering av lerknidipin. En interaktionsstudie med ketokonazol, som är en stark hämmare av CYP3A4, gav en avsevärd ökning i lerknidipins plasmanivåer (en 15-faldig ökning i AUC och en 8-faldig ökning av C_{max} för eutomeren S-lerknidipin). Samtidig användning av lerknidipin och CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, erytromycin, troleandomycin, klaritromycin) ska undvikas (se avsnitt 4.3).

Ciklosporin

Ökade plasmanivåer av både lerknidipin och ciklosporin har observerats efter samtidig tillförsel. En studie med unga, friska frivilliga har visat att när ciklosporin administrerades 3 timmar efter lerknidipin ändrades inte lerknidipins plasmanivåer, medan ciklosporins AUC ökade med 27 %. Samtidig administrering av lerknidipin och ciklosporin har dock orsakat en trefaldig ökning av lerknidipins plasmanivåer och en 21 %-ökning av ciklosporins AUC.

Ciklosporin och lerknidipin ska inte administreras samtidigt (se avsnitt 4.3).

Grapefruktjuice

Liksom andra dihydropyridinderivat, kan metabolismen av lerknidipin hämmas till följd av intag av grapefrukt eller grapefruktjuice vilket leder till ökad systemisk tillgänglighet och ökad hypotensiv effekt. Lerknidipin ska inte tas med grapefrukt eller grapefruktjuice (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning rekommenderas inte

CYP3A4-inducerare

Försiktighet ska iakttas vid samtidig tillförsel av lerknidipin och CYP3A4-inducerare såsom antiepileptika (t.ex. fenytoin, karbamazepin) och rifampicin eftersom lerknidipins antihypertensiva effekt kan minska. Blodtrycket måste därför kontrolleras oftare än normalt (se avsnitt 4.4).

Alkohol

Alkohol ska undvikas eftersom effekten av vasodilaterande blodtryckssänkande medel kan förstärkas (se avsnitt 4.4).

Försiktighetsåtgärder inklusive dosjustering

Substrat för CYP3A4

Försiktighet ska iakttagas när lerknidipin administreras tillsammans med andra substrat för CYP3A4 såsom terfenadin, astemizol eller antiarytmika av klass III, såsom amiodaron och kinidin.

Midzolam

När en dos på 20 mg gavs tillsammans med midazolam peroralt till äldre frivilliga ökade lerknidipins absorption (med ca 40 %) och absorptionshastigheten minskade (t_{max} försenades från 1,75 till 3 timmar). Midazolamkoncentrationen ändrades inte.

Metoprolol

När lerknidipin administrerades tillsammans med metoprolol, en beta-blockerare som elimineras huvudsakligen via levern, ändrades inte metoprolols biotillgänglighet medan lerknidipins reducerades med 50 %. Denna effekt kan bero på minskningen av blodflödet i levern som orsakas av beta-blockerare och kan därför uppstå med andra läkemedel i samma klass. Följaktligen kan lerknidipin administreras säkert tillsammans med beta-adrenoreceptorblockerande läkemedel men dosjustering kan krävas.

Digoxin

Samtidig tillförsel av 20 mg lerknidipin till patienter som under lång tid behandlats med β -metyldigoxin visade inga tecken på farmakokinetisk interaktion. Dock observerades en genomsnittlig ökning med 33 % av digoxins C_{max} medan AUC och njurclearance inte

ändrades signifikant. Patienter som samtidigt behandlas med digoxin ska stå under noggrann klinisk observation avseende tecken på toxiska effekter av digoxin.

Samtidig användning med andra läkemedel

Fluoxetin

En interaktionsstudie med fluoxetin (en hämmare av CYP 2D6 och CYP3A4), utförd på friska frivilliga i åldern 65 ± 7 år (medel \pm standardavvikelse), visade ingen klinisk relevant modifiering av lerkanidipins farmakokinetik.

Cimetidin

Samtidig tillförsel av en daglig dos cimetidin på 800 mg orsakar inga signifikanta förändringar av lerkanidipinnivåerna i plasma men försiktighet ska iakttas vid högre doser eftersom lerkanidipins biotillgänglighet kan öka och därmed även den blodtryckssänkande effekten.

Simvastatin

När en dos på 20 mg lerkanidipin administrerades upprepade gånger tillsammans med 40 mg simvastatin ändrades inte lerkanidipins AUC signifikant, medan simvastatins AUC ökade med 56 % och dess aktiva metabolit β -hydroxisyra med 28 %. Det är inte troligt att sådana ändringar har klinisk relevans. Någon interaktion förväntas ej när lerkanidipin administreras på morgonen och simvastatin på kvällen, såsom är indicerat för sådana läkemedel.

Warfarin

Samtidig administrering av 20 mg lerkanidipin till fastande, friska frivilliga förändrade inte warfarins farmakokinetik.

Diuretika och ACE-hämmare

Lerkanidipin har administrerats säkert med diuretika och ACE-hämmare.

Andra läkemedel som påverkar blodtrycket

Liksom med alla blodtryckssänkande läkemedel kan ökade antihypertensiva effekter observeras när lerkanidipin administreras med andra läkemedel som påverkar blodtrycket, såsom alfablockerare för behandling av urinsymtom, tricykliska antidepressiva och neuroleptika. Motsatt kan en minskning av den blodtryckssänkande effekten observeras vid samtidig användning av kortikosteroider.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Enalapril

Behandling med ACE-hämmare (enalapril) rekommenderas inte under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). Behandling med ACE-hämmare (enalapril) är kontraindicerad under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologisk evidens angående risken för teratogenicitet efter exponering för ACE-hämmare under första trimestern av graviditeten har inte varit konklusiv, dock kan en liten ökning av risken inte uteslutas. Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare anses nödvändig, ska patienter som planerar att bli gravida byta till en alternativ antihypertensiv behandling som har en etablerad, säker profil för användning under graviditet. När graviditeten upptäcks, ska behandlingen med ACE-hämmare upphöra omedelbart, och om möjligt ska annan behandling inledas.

Det är känt att exponering för ACE-hämmare under andra och tredje trimestern inducerar human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemia) (se avsnitt 5.3). Oligohydramnios hos modern, som troligtvis tyder på nedsatt njurfunktion hos fostret, har inträffat och kan resultera i kontrakturer i extremiteter, kraniofaciala deformationer och hypoplastisk lungutveckling. Om fostret exponeras för en ACE-hämmare från och med andra trimestern, rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle. Spädbarn, vars mödrar har tagit ACE-hämmare, ska observeras noggrant med avseende på hypotoni (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Lerkanidipin

Det finns inga data från användning av lerkanidipin i gravida kvinnor. Djurstudier har inte visat några teratogena effekter (se avsnitt 5.3), men andra dihydropyridinföreningar har visat sig vara teratogena hos djur.

Lerkanidipin rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel (se avsnitt 4.4).

Enalapril och lerkanidipin i kombination

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av enalaprilmaleat/lerkanidipinhydroklorid i gravida kvinnor. Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Zanipress ska inte användas under graviditetens andra och tredje trimester. Användning rekommenderas inte under graviditetens första trimester eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Enalapril

Begränsade farmakokinetiska data visar på mycket låga koncentrationer i modersmjölk (se avsnitt 5.2). Trots att dessa koncentrationer förefaller vara kliniskt irrelevanta, rekommenderas inte användning av enalapril vid amning av prematura barn eller under de närmsta veckorna efter förlossningen, på grund av möjlig risk för kardiovaskulära och renala effekter samt bristande klinisk erfarenhet. I fall med äldre spädbarn kan användning av enalapril hos en ammande moder övervägas om behandlingen är nödvändig för modern och barnet följs upp med avseende på biverkningar.

Lerkanidipin

Det är okänt om lerkanidipin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Lerkanidipin ska inte användas under amning.

Enalapril och lerkanidipin i kombination

Följaktligen ska Zanipress inte användas under amning.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data tillgängliga för lerkanidipin. Reversibla biokemiska förändringar i huvudregionen på spermatozoerna, vilket kan försämra fertiliteten, har rapporterats hos några patienter som behandlats med kalciumkanalblockerare. I de fall där upprepade *in vitro*-försök har misslyckats och där ingen annan förklaring kunnat hittats, ska man överväga möjligheten att kalciumkanalblockerare kan vara orsaken.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zanipress har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Dock ska försiktighet iakttas eftersom yrsel, asteni, trötthet och i ovanliga fall somnolens kan förekomma (se avsnitt 4.8).

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för Zanipress har utvärderats i fem dubbeldolda kontrollerade kliniska studier och i två långvariga öppna förlängningsfaser. Totalt behandlades 1 141 patienter med Zanipress i doserna 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg samt 20 mg/20 mg. De biverkningar som observerats med kombinationsbehandling har varit jämförbara med de som tidigare observerats med endera bestårdsdel som monoterapi. De vanligaste rapporterade biverkningarna vid behandling med Zanipress var hosta (4,03 %), yrsel (1,67 %) och huvudvärk (1,67 %).

Sammanfattning i tabellform av biverkningar

I tabellen nedan listas biverkningar rapporterade i kliniska studier med Zanipress 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg och 20 mg/20 mg för vilka ett rimligt orsakssamband föreligger. Biverkningarna är listade efter organsystemklassificering enligt MedDRA och frekvens: mycket vanliga ($\geq 1/10$), vanliga ($\geq 1/100, < 1/10$), mindre vanliga ($\geq 1/1\ 000, < 1/100$), sällsynta ($\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$) mycket sällsynta ($< 1/10\ 000$), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet	
Mindre vanliga	Trombocytopeni
Sällsynta	Sänkt hemoglobin
Immunsystemet	
Sällsynta	Överkänslighet
Metabolism och nutrition	
Mindre vanliga	Hyperkalemi
Psykiska störningar	
Mindre vanliga	Ångest
Centrala och perifera nervsystemet	
Vanliga	Yrsel, huvudvärk
Mindre vanliga	Postural yrsel
Öron och balansorgan	
Mindre vanliga	Vertigo
Sällsynta	Tinnitus
Hjärtat	
Mindre vanliga	Takykardi, hjärtklappning
Blodkärl	
Mindre vanliga	Rodnad, hypotoni
Sällsynta	Cirkulationskolaps
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum	
Vanliga	Hosta
Sällsynta	Torrhett i halsen, orofaryngeal smärta
Magtarmkanalen	
Mindre vanliga	Buksmärta, förstopning, illamående
Sällsynta	Dyspepsi, läppödem, tungbesvär, diarré, muntorrhett, gingivit
Lever och gallvägar	
Mindre vanliga	Förhöjt ALAT, förhöjt ASAT
Hud och subkutan vävnad	
Mindre vanliga	Erytem
Sällsynta	Angioödem, ansiktssvullnad, dermatit, hudutslag, urtikaria
Muskuloskeletal system och bindväv	

Mindre vanliga	Artralgi
Njurar och urinvägar	
Mindre vanliga	Pollakisuri
Sällsynta	Nokturi, polyuri
Reproduktionsorgan och bröstkörtel	
Sällsynta	Erektil dysfunktion
Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället	
Mindre vanliga	Asteni, trötthet, värmekänsla, perifert ödem

Biverkningar som uppträdde hos endast en patient redovisas under frekvensen sällsynta.

Ytterligare information om de individuella komponenterna.

Biverkningar rapporterade för en av de individuella komponenterna (enalapril eller lerkanidipin) kan också vara potentiella biverkningar av Zanipress, även om de inte har observerats i kliniska prövningar eller under perioden efter godkännandet.

Enbart enalapril

Bland rapporterade biverkningar för enalapril återfinns:

Blodet och lymfssystemet:

Mindre vanliga: anemi (inklusive aplastisk och hemolytisk)

Sällsynta: neutropeni, sänkning av hemoglobin, sänkning av hematokrit, trombocytopeni, agranulocytos, benmärgsdepression, pancytopeni, lymfadenopati, autoimmuna sjukdomar

Endokrina systemet:

Ingen känd frekvens: syndrom av antidiuretiskt hormon (SIADH)

Metabolism och nutrition:

Mindre vanliga: hypoglykemi (se avsnitt 4.4)

Psykiatiska störningar:

Vanliga: depression

Mindre vanliga: förvirring, nervositet, insomni

Sällsynta: abnorma drömmar, sömnstörningar

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: yrsel

Mindre vanliga: huvudvärk, synkope, smakförändringar

Sällsynta: sommolens, parestesi, vertigo

Ögon:

Mycket vanliga: dimsyn

Öron och balansorgan:

Mindre vanliga: tinnitus

Hjärtat:

Vanliga: bröstsmärta, arytmistörningar, angina pectoris, takykardi

Mindre vanliga: palpitationer, hjärtinfarkt eller cerebrovaskulär händelse*, möjlig sekundärt till kraftig hypotoni hos högriskpatienter (se avsnitt 4.4)

* Incidenstalen var jämförbara med dem för grupperna med placebo och aktiv kontroll i de kliniska studierna.

Blodkärl:

Vanliga: hypotoni (inklusive ortostatisk hypotoni)

Mindre vanliga: rodnad, ortostatisk hypotoni

Sällsynta: Raynauds fenomen

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mycket vanliga: hosta

Vanliga: dyspné

Mindre vanliga: rinnnsnuva, halsont och heshet, bronkospasm/astma

Sällsynta: lunginfiltrat, rinit, allergisk alveolit/eosinofil lunginflammation

Magtarmkanalen:

Mycket vanliga: illamående

Vanliga: diarré, magsmärter

Mindre vanliga: tarmvred, pankreatit, kräkningar, dyspepsi, förstopning, anorexi, magirritationer, munorrhett, peptiskt ulcus

Sällsynta: stomatit/aftosa ulcerationer, glossit

Mycket sällsynta: intestinalt angioödem

Lever och gallvägar:

Sällsynta: leversvikt, hepatit – antingen hepatocellulär eller kolestatisk, hepatit inklusive nekros, kolestas (inklusive gulsort)

Hud och subkutan vävnad:

Vanliga: utslag, överkänslighet/angioneurotiskt ödem: angioödem i ansikte, extremiteter, läppar, tunga, stämband och/eller struphuvud har rapporterats (se avsnitt 4.4)

Mindre vanliga: diafores, pruritus, urtikaria, alopeci

Sällsynta: erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit, toxisk epidermal nekroly, pemfigus, erytrodermi

Ett symptomkomplex har beskrivits, som kan inkludera ett eller flera av följande: feber, serosit, vaskulit, myalgi/myosit, artralgi/artrit, positiv ANA, förhöjd ESR, eosinofili, leukocytos.

Utslag, fotosensitivitet eller andra dermatologiska symptom kan förekomma.

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mindre vanliga: muskelkrampar

Njurar och urinvägar:

Mindre vanliga: nedslatt njurfunktion, njursvikt, proteinuri

Sällsynta: oliguri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga: impotens

Sällsynta: gynekomasti

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället:

Mycket vanliga: asteni

Vanliga: trötthet

Mindre vanliga: allmän sjukdomskänsla, feber

Undersökningar:

Vanliga: hyperkalemi, förhöjda nivåer av serumkreatinin
Mindre vanliga: förhöjda nivåer av urea i blodet, hyponatremi
Sällsynta: ökad mängd leverenzym, ökad nivå av serumbilirubin

Enbart lerkänipin

De vanligast förekommande biverkningarna som har rapporterats i kliniska prövningar och efter marknadsintroduktionen är perifert ödem, huvudvärk, rodnad, takykardi och palpitationer.

Immunsystemet:

Mycket sällsynta: överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: huvudvärk
Mindre vanliga: yrsel
Sällsynta: somnolens, synkope

Hjärtat:

Vanliga: takykardi, palpitationer
Sällsynta: angina pectoris

Blodkärl:

Vanliga: rodnad
Mindre vanliga: hypotonii

Magtarmkanalen:

Mindre vanliga: illamående, dyspepsi, smärtor i övre buken
Sällsynta: kräkningar, diarré
Ingen känd frekvens: gingival hypertrofi¹, grumlig peritonealvätska¹

Lever och gallvägar:

Ingen känd frekvens: förhöjda serumtransaminaser¹

Hud och subkutan vävnad:

Mindre vanliga: hudutslag, klåda
Sällsynta: urtikaria
Ingen känd frekvens: angioödem¹

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mindre vanliga: myalgi

Njurar och urinvägar:

Mindre vanliga: polyuri
Sällsynta: pollakisuri

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga: perifert ödem
Mindre vanliga: asteni, trötthet
Sällsynta: bröstsmärta

¹ Biverkningar från spontanrapportering efter marknadsintroduktionen världen över.

Vissa dihydropyridinderivat kan i sällsynta fall orsaka prekordial smärta eller angina pectoris. I mycket sällsynta fall kan patienter som redan lider av angina pectoris drabbas av tätare, svårare eller mer långdragna attacker. Enstaka fall av hjärtinfarkt har rapporterats. Lerkanidipin tycks inte påverka blodsocker- eller serumlipidnivåer.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

4.9 Överdosering

Efter introduktionen på marknaden har några fall av avsiktlig överdosering som krävde sjukhusvård rapporterats med enalapril/lerkanidipin vid doser från 100 upp till 1000 mg vardera.

De rapporterade symptomen (minskat systoliskt blodtryck, bradykardi, rastlöshet, somnolens och flanksmärta) kan också bero på samtidig administrering av höga doser av andra läkemedel (t.ex. betablockerare).

Symtom vid överdosering av enalapril och lerkanidipin var för sig

De mest framträdande effekterna som hittills rapporterats för enalapril vid överdosering är uttalad hypotoni, som uppträder cirka sex timmar efter intag av tabletter, samtidigt med blockad av renin-angiotensin-systemet och stupor. Symtom som associeras med överdosering av ACE-hämmare inkluderar cirkulatorisk chock, elektrolytrubbningsar, njursvikt, hyperventilering, takykardi, palpitationer, bradykardi, yrsel, ångest och hosta. Serumenalaprilatnivåer 100 och 200 gånger högre än normalt efter terapeutiska doser har rapporterats efter intag av 300 mg respektive 440 mg enalapril.

I likhet med andra dihydropyridinderivat, kan överdosering av lerkanidipin förväntas orsaka kraftig perifer vasodilatation med uttalad hypotoni och reflextakykardi. Vid mycket höga doser kan dock perifer selektivitet gå förlorad, med bradykardi och en negativ inotrop effekt som följd. De vanligaste biverkningarna i samband med överdosering har varit hypotoni, yrsel, huvudvärk och palpitationer.

Behandling vid överdosering av enalapril och lerkanidipin var för sig:

Rekommenderad behandling vid överdosering av enalapril är intravenös infusion av vanlig saltlösning. Om hypotoni uppkommer ska patienten placeras i chockläge. Om tillgängligt kan behandling med angiotensin-II-infusion och/eller intravenösa katekolaminer också övervägas. Om intaget skett nyligen ska åtgärder vidtas för att avlägsna enalaprilmaleat (t.ex. kräkning, ventrikelsköljning, administrering av absorbenter eller natriumsulfat). Enalaprilat kan avlägsnas från cirkulationen via hemodialys (se avsnitt 4.4). Behandling med pacemaker är indicerad vid terapiresistent bradykardi. Vitala tecken, serumelektrolyter och kreatininkoncentrationer ska kontrolleras regelbundet.

Vid kliniskt signifikant hypotoni orsakad av överdosering av lerkanidipin krävs kardiovaskulärt stöd med tät kontroller av hjärt- och andningsfunktion, benen i högläge och uppmärksamhet på cirkulerande vätskevolym och urinvolym. Med tanke på lerkanidipins långvariga farmakologiska effekt är det viktigt att patientens kardiovaskulära status övervakas under minst 24 timmar efter överdosering. Eftersom proteinbindningsgraden är hög är dialys sannolikt inte effektiv. Patienter som med förväntad måttlig eller allvarlig intoxikation ska observeras på intensivvårdsavdelning.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: ACE-hämmare och kalciumantagonister: enalapril och lerkanidipin.

ATC-kod: C09BB02

Zanipress är den fasta kombinationen av ACE-hämmare (enalapril) och en kalciumkanalblockerare (lerkanidipin). De är två blodtryckssänkande substanser med kompletterande verkningsmekanism för att kontrollera blodtrycket hos patienter med essentiell hypertoni.

Enalapril

Enalaprilmaleat är maleatsaltet av enalapril, ett derivat av två aminosyror, L-alanin och L-prolin. Angiotensinkonverterande enzym (ACE) är ett peptidylpeptidas som katalyserar omvandlingen av angiotensin I till vasopressorsubstansen angiotensin II. Efter absorption hydrolyseras enalapril till enalaprilat som hämmar ACE. Hämning av ACE leder till minskad mängd angiotensin II i plasma, vilket i sin tur leder till ökad reninaktivitet i plasma (på grund av avlägsnad negativ återkoppling på reninfrisättningen) och minskad aldosteronutsöndring.

ACE är identiskt med kininas II. Därför kan enalapril blockera nedbrytningen av bradykinin, en potent vasodepressorpeptid, men betydelsen av detta för de terapeutiska effekterna av enalapril återstår att klarrägga.

Trots att mekanismen genom vilken enalapril sänker blodtrycket antas vara primär hämning av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, är enalapril antihypertensivt även hos patienter med låga reninnivåer.

Administrering av enalapril till patienter med hypertoni resulterar i en sänkning av blodtrycket, både i liggande och stående ställning, utan att hjärtfrekvensen ökar signifikant.

Symptomatisk postural hypotoni är ovanlig. Hos vissa patienter kan flera veckors behandling krävas för att optimal blodtryckssänkning ska erhållas. Abrupt utsättning av enalapril har inte satts i samband med en snabb stegring av blodtrycket.

Effektiv hämning av ACE-aktivitet erhålls vanligen 2 till 4 timmar efter oral administrering av en engångsdos av enalapril. En begynnande sänkning av blodtrycket ses vanligtvis efter en timme och maximal sänkning 4 till 6 timmar efter administrering. Effektens varaktighet är dosberoende, men vid rekommenderade doser har antihypertensiva och hemodynamiska effekter visats kvarstå under minst 24 timmar.

I hemodynamiska studier på patienter med essentiell hypertoni åtföljdes blodtryckssänkningen av minskad perifer arteriell resistens, ökad hjärtminutvolym och en liten eller ingen förändring av hjärtfrekvensen. Efter administrering av enalapril ökade blodflödet i njurarna, men den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) var oförändrad. Det fanns inga tecken på natrium- eller vätskeretention. Hos patienter med låg GFR före behandlingen ökade dock vanligtvis filtrationshastigheten.

I kliniska korttidsstudier på patienter med njursjukdom med och utan diabetes sågs minskningar av albuminuri, utsöndring av IgG i urinen och total proteinmängd i urinen efter administrering av enalapril.

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljd av evidens för slutorganskada. VA NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnephropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nyta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemia, akut njurskada och/eller hypotoni observerades jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare ska därför inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnephropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i aliskirengruppen än i placebogruppen och biverkningar och allvarliga biverkningar (hyperkalemia, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskirengruppen än i placebogruppen.

Lerkanidipin

Lerkanidipin är en kalciumantagonist som tillhör gruppen dihydropyridinderivat och som hämmar det transmembrana inflodet av kalciumjoner till hjärtmuskeln och glatt muskulatur. Dess antihypertensiva verkan beror på en direkt relaxerande effekt på glatt muskulatur i blodkärl som därigenom reducerar det totala perifera motståndet. Trots sin korta halveringstid har lerkanidipin en långvarig antihypertensiv verkan på grund av sin höga membranaffinitet, och på grund av den höga kärlselektiviteten har läkemedlet inga negativa inotropa effekter.

Eftersom den vasodilatation som lerkanidipin framkallar sätter in gradvis, har akut hypotoni med reflextakyardi sällan observerats hos patienter med hypertoni.

Lerkanidipins antihypertensiva verkan beror huvudsakligen på dess (S)-enantiomer liksom fallet är för andra asymmetriska 1,4-dihydropyridinderivat.

Enalapril/lerkanidipin

Kombinationen av dessa substanser har en additiv blodtryckssänkande effekt och minskar blodtrycket i högre grad än komponenterna var för sig.

- Zanipress 10 mg/10 mg

I en pivotal, dubbelblind, add-on studie i fas III utförd på 342 patienter som inte svarat på lerkanidipin 10 mg (definierat som sittande diastoliskt blodtryck 95-114 och sittande systoliskt blodtryck 140-189 mmHg), var minskningen av dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck 5,4 mmHg större med kombinationen enalapril 10 mg/lerkanidipin 10 mg än med lerkanidipin 10 mg ensamt efter 12 veckors dubbelblind behandling (-7,7 mmHg vs -2,3 mmHg, p<0,001). Även minskningen av dalvärdet för sittande diastoliskt blodtryck var 2,8 mmHg större med kombinationen jämfört med monoterapi

(-7,1 mmHg vs -4,3 mmHg, p<0,001). Svarsfrekvensen var signifikant högre med kombinationsterapi än med monoterapi: 41 % vs 24 % (p<0,001) för sittande systoliskt blodtryck och 35 % vs 24 % (p=0,032) för sittande diastoliskt blodtryck. En signifikant större andel av patienterna som fick kombinationsbehandling upplevde normalisering av sittande systoliskt blodtryck (39 % vs 22 %, p<0,001) och av sittande diastoliskt blodtryck (29 % vs 19 %, p<0,023) jämfört med patienter som fick monoterapi. I studiens öppna, långvariga uppföljningsfas var titrering av kombinationen enalapril 20 mg/lérkanidipin 10 mg tillåten om blodtrycket var >140/90 mmHg: titrering förekom hos 133/221 patienter och i 1/3 av dessa fall normaliseras sittande diastoliskt blodtryck.

- Zanipress 20 mg/10 mg

I en pivotal, dubbelblind, add-on klinisk studie i fas III utförd på 327 patienter som inte svarat på enalapril 20 mg (definierat som sittande diastoliskt blodtryck 95-114 och sittande systoliskt blodtryck 140-189 mmHg), uppnådde patienter på enalapril 20 mg/lérkanidipin 10 mg en signifikant större reduktion i dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck jämfört med de på monoterapi (-9,8 vs -6,7 mmHg, p=0,013) och i dalvärdet för sittande diastoliskt blodtryck (-9,2 vs -7,5 mmHg, p=0,015). Svarsfrekvensen var inte signifikant högre med kombinationsterapi än med monoterapi (53 % vs 43 %, p=0,076 för sittande diastoliskt blodtryck och 41 % vs 33 %, p=0,116 för sittande systoliskt blodtryck) och en inte signifikant större andel av patienterna på kombinationsbehandling upplevde en normalisering av sittande diastoliskt blodtryck (48 % vs 37 %, p=0,055) och sittande systoliskt blodtryck (33 % vs 28 %, p=0,325) jämfört med patienter i monoterapi.

- Zanipress 20 mg/20 mg

I en placebo- och aktivt kontrollerad, randomiserad, dubbelblind studie med faktoriell design utförd på 1 039 patienter med måttlig hypertoni (definierad som sittande diastoliskt blodtryck 100-109 mmHg, sittande systoliskt blodtryck <180 mmHg mätt på klinik och diastoliskt blodtryck \geq 85 mmHg mätt i hemmet), hade patienter på enalapril 20 mg/lérkanidipin 20 mg en betydligt större minskning av sittande diastoliskt blodtryck och sittande systoliskt blodtryck mätt på klinik jämfört med placebo (p<0,001). Kliniskt relevanta skillnader i förändringen från baslinjen i dalvärdet för sittande diastoliskt blodtryck mätt på klinik observerades mellan kombinationsbehandling 20 mg/20 mg (-15,2 mmHg, n=113) jämfört med enbart enalapril 20 mg (-11,3 mmHg, P=0,004, n=113) eller enbart lérkanidipin 20 mg (-13,0 mmHg, p=0,092, n=113). Likaså sågs kliniskt relevanta skillnader i förändringen från baslinjen i dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck mätt på klinik mellan kombinationsbehandling 20 mg/20 mg (-19,2 mmHg) jämfört med enbart lérkanidipin 20 mg (-13,0 mmHg, p=0,002) eller enbart enalapril 20 mg (-15,3 mmHg, p=0,055). Kliniskt relevanta skillnader observerades också i systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck mätt i hemmet. En betydande ökning av svarsfrekvensen för sittande diastoliskt blodtryck (75 %) och sittande systoliskt blodtryck (71 %) observerades med kombinationsterapi 20 mg/20 mg jämfört med placebo (p<0,001) och båda monoterapier (p<0,01). Normalisering av blodtrycket uppnåddes av en större andel av patienterna som behandlades med kombinationsbehandling 20 mg/20 mg (42 %) än med placebo (22 %).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Inga farmakokinetiska interaktioner har observerats vid samtidig administrering av lérkanidipin och enalapril.

Enalaprils farmakokinetik

Absorption

Oralt enalapril absorberas snabbt och maxima koncentrationer av enalapril uppnås inom en timme. Baserat på återfunnen mängd i urin är absorptionsgraden av enalapril från oralt enalaprilmaleat cirka 60 %. Absorptionen påverkas inte av förekomst av föda i magtarmkanalen.

Distribution

Efter absorption hydrolyseras enalapril snabbt och i stor omfattning till enalaprilat, en potent ACE-hämmare. Maximal serumkoncentration av enalaprilat uppnås ca 4 timmar efter en oral dos av enalaprilmaleat. Den effektiva halveringstiden för ackumulering av enalaprilat efter

upprepade doser av oralt enalapril är 11 timmar. Hos personer med normal njurfunktion uppnåddes steady state-koncentrationer i serum av enalaprilat efter 4 dagars behandling. Bindningen av enalaprilat till humana plasmaproteiner överstiger inte 60 % inom det koncentrationsområde som är terapeutiskt relevant.

Metabolism

Förutom omvandlingen till enalaprilat finns ingen evidens för signifikant metabolism av enalapril.

Eliminering

Enalaprilat utsöndras huvudsakligen via njurarna. De huvudsakliga komponenterna i urin är enalaprilat (ca 40 % av dosen) och oförändrat enalapril (ca 20 %).

Nedsatt njurfunktion

Exponeringen av enalapril och enalaprilat ökar hos patienter med njurinsufficiens. Hos patienter med mild till måttlig njurinsufficiens (kreatinin clearance 40-60 ml/min) var AUC för enalaprilat vid steady state cirka två gånger högre än hos patienter med normal njurfunktion efter administrering av 5 mg en gång dagligen. Vid gravt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance \leq 30 ml/min) ökade AUC cirka 8 gånger. Den effektiva halveringstiden för enalaprilat efter flera doser enalaprilmaleat är förlängd vid denna grad av njurinsufficiens och tiden till steady state är förlängd (se avsnitt 4.2). Enalaprilat kan avlägsnas från cirkulationen via hemodialys. Dialysclearance är 62 ml/min.

Amning

Efter en oral engångsdos på 20 mg till fem nyförlösta kvinnor var den genomsnittliga maximala koncentrationen av enalapril i bröstmjölk 1,7 µg/liter (intervall 0,54 till 5,9 µg/liter) vid 4 till 6 timmar efter dosering. Den genomsnittliga maximala koncentrationen av enalaprilat var 1,7 µg/liter (intervall 1,2 till 2,3 µg/liter), där maximal koncentration uppnåddes vid olika tidpunkter under en 24-timmarsperiod. Utifrån data om maximala koncentrationer i bröstmjölk blir beräknat maximalt intag hos ett spädbarn som uteslutande ammas cirka 0,16 % av moderns viktjusterade dos.

Hos en kvinna som behandlats med oralt enalapril 10 mg dagligen i 11 månader uppnåddes maximala koncentrationer av enalapril i bröstmjölk på 2 µg/liter 4 timmar efter dosering och maximala koncentrationer av enalaprilat på 0,75 µg/liter cirka 9 timmar efter dosering. Den totala uppmätta mängden av enalapril och enalaprilat i bröstmjölk under 24-timmarsperioden var 1,44 µg/liter bröstmjölk respektive 0,63 µg/liter bröstmjölk. Koncentrationerna av enalaprilat i bröstmjölk var icke-detekterbara ($<0,2$ µg/liter) 4 timmar efter en engångsdos av enalapril 5 mg hos en moder samt 10 mg hos två mödrar. Koncentrationerna av enalapril fastställdes inte.

Lerkanidipins farmakokinetik

Absorption

Lerkanidipin absorberas fullständigt efter peroral administrering och maximal plasmakoncentration uppnås cirka 1,5-3 timmar efter tillförsel.

Lerkanidipins två enantiomerer uppvisar en jämförbar plasmakoncentrationsprofil: tid till maximal plasmakoncentration är densamma och maximal plasmakoncentration och AUC är i genomsnitt 1,2 gånger högre för (S)-enantiomeren. Elimineringshalveringstiden för de två enantiomererna är i princip densamma. Ingen inbördes omvandling av de två enantiomererna har observerats "in vivo".

På grund av den höga förstapassagemetabolismen är den absoluta biotillgängligheten för oralt

lerkanidipin vid icke-fastande cirka 10 %. Biotillgängligheten vid intag på fastande mage hos friska frivilliga reduceras dock till 1/3.

Lerkanidipins perorala tillgänglighet ökar fyrfaldigt vid intag upp till 2 timmar efter en måltid med hög fetthalt. Därför ska läkemedlet intas före måltid.

Distribution

Distributionen från plasma till vävnader och organ är snabb och omfattande.

Lerkanidipins bindningsgrad till plasmaproteiner överstiger 98 %. Eftersom plasmaproteinnivåerna är lägre hos patienter med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion, kan läkemedlets fria fraktion vara högre hos dessa patienter.

Metabolism

Lerkanidipin metaboliseras i stor utsträckning av CYP3A4. Modersubstansen har inte påvisats i urin eller feces. Lerkanidipin omvandlas huvudsakligen till inaktiva metaboliter och cirka 50 % av dosen utsöndras i urinen.

In vitro-studier med humana levermikrosomer har visat att lerkanidipin i viss mån hämmar CYP3A4 och CYP2D6 vid koncentrationer 160 respektive 40 gånger högre än de maximala koncentrationerna i plasma efter en dos på 20 mg.

Dessutom har interaktionsstudier på mänskliga visat att lerkanidipin inte påverkar plasmanivåerna av midazolam, ett typiskt CYP3A4-substrat, eller metoprolol, ett typiskt CYP2D6-substrat. Vid terapeutiska doser förväntas därför inte lerkanidipin hämma metabolismen av läkemedel som metaboliseras via CYP3A4 och CYP2D6.

Eliminering

Elimineringen sker huvudsakligen genom metabolism.

Den genomsnittliga terminala halveringstiden beräknades till 8-10 timmar och på grund av den höggradiga bindningen till lipidmembraner varar den terapeutiska effekten i 24 timmar. Lerkanidipin ackumulerades inte vid upprepad tillförsel.

Linjäritet/icke-linjäritet

Oral administrering av lerkanidipin resulterar i plasmakoncentrationer som inte står i direkt proportion till dosen (icke-linjär kinetik). Efter 10, 20 eller 40 mg var förhållandet för maximala plasmakoncentrationer 1:3:8 och förhållandet för ytan under kurvan för plasmakoncentration-tid var 1:4:18, vilket tyder på en progressiv mättnad av förstapassagemetabolismen. Biotillgängligheten ökar därmed med höjd dos.

Särskilda populationer

Farmakokinetiken för lerkanidipin är ungefär densamma hos äldre patienter och patienter med lätt till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion som hos den allmänna patientpopulationen. Patienter med gravt nedsatt njurfunktion eller dialysberoende patienter upptäcktes högre koncentrationer av läkemedlet (ca 70 %). Hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion ökar sannolikt den systemiska biotillgängligheten hos lerkanidipin eftersom läkemedlet i normalt metaboliseras i hög grad i levern.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Enalapril/lerkanidipin i kombination

Potentiell toxicitet av den fasta kombinationen lerkanidipin och enalapril har studerats i råtta

efter peroral administrering i upp till 3 månader och i två gentoxicitetsstudier. Kombinationen förändrade inte den toxikologiska profilen för de två individuella komponenterna.

Följande data finns för de två individuella komponenterna, enalapril och lerkanidipin.

Enalapril

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäントoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för mänskliga.

Reproduktionsotoxicitetsstudier visar att enalapril inte har några effekter på fertilitet och reproduktionsförmåga hos råtta, och att det inte heller är teratogen. I en studie där honråttor doserades innan parning och under dräktigheten, ökade mortaliteten hos avkommor under diperioden. Substansen har visats passera placentan och utsöndras i bröstmjölk. Som grupp har ACE-hämmare visats inducera biverkningar under den sena delen fosterutvecklingen, vilket resulterat i fosterdöd och kongenitala effekter som framförallt påverkat skallen. Fosterotoxicitet, intrauterin tillväxthämnning och öppetstående ductus arteriosus har också rapporterats. Dessa utvecklingsanomalier antas delvis bero på ACE-hämmares direkta effekt på det fetala renin-angiotensinsystemet och delvis på ischemi orsakad av moderns hypotoni och minskat fetalt-placentalt blodflöde och syre-/näringstillförsel till fostret.

Lerkanidipin

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäントoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproductionseffekter visade inte några särskilda risker för mänskliga.

De relevanta effekter som har observerats i långtidsstudier i råtta och hund var direkt eller indirekt relaterade till de kända effekterna av kaliumantagonister, och speglar främst överdriven farmakodynamisk aktivitet.

Behandling med lerkanidipin hade ingen effekt på fertiliteten eller allmän reproduktionsförmåga hos råtta, men inducerade pre- och postimplantationsdöd och försenad fosterutveckling vid höga doser. Det fanns ingen evidens för någon teratogen effekt hos råtta och kanin, men andra dihydropyridiner har visat sig vara teratogena hos djur. Lerkanidipin inducerade dystoki vid administrering av hög dos (12 mg/kg kroppsvikt/dag) under nedkomsten.

Inga studier har utförts på distributionen av lerkanidipin och/eller dess metaboliter hos dräktiga djur eller utsöndringen i bröstmjölk.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmännen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Natriumstärkelseglykolat typ A

Povidon K30

Natriumvätekarbonat

Magnesiumstearat

Filmdrägering:

Hypromellos 5 cP

Titandioxid (E171)

Talk

Makrogol 6000

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktäktskänsligt. Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackning av polyamid-aluminium-PVC/aluminium.
7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Recordati Ireland Limited

Raheens East

Ringaskiddy

Co. Cork

Irland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

24244

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

24.7.2008

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

31.01.2022